2026/07/20, 2026 확률 기초 세미나

이공학도를 위한 확률 및 통계학

- 2장 확률 -

김 민 식 (minsik@pel.sejong.ac.kr)

세종대학교 프로토콜공학연구실

목 차

- 표본공간(Sample Space)
- 사상(Events)
- 경우의 수(Number of Cases)
- 사상의 확률(Probability)
- 가법정리(Additive Rule)
- 조건부 확률(Conditional Probability)
- 베이즈 정리(Bayes' Rule)

목 차

- 표본공간(Sample Space)
- 사상(Events)
- 경우의 수(Number of Cases)
- 사상의 확률(Probability)
- 가법정리(Additive Rule)
- 조건부 확률(Conditional Probability)
- 베이즈 정리(Bayes' Rule)

표본공간(Sample Space)

- 정의
  - 통계적 실험에서 발생 가능한 모든 결과들의 집합
- 특징
  - 일반적으로 기호 S로 표현함
  - 각 결과를 원소(Element or Member), 혹은 표본점(Sample Point)라고 함
  - 결과가 유한한 경우 중괄호 안에 모든 표본점을 나열하여 표현할 수 있음
  - 결과가 무한하거나 직접 나열하기 어려운 경우 수식 또는 조건을 이용하여 표현 가능함
    - e.g., $S = \{x | x$는 인구가 백만이 넘는 도시$\}$

표본공간(Sample Space)

- 정보보호에서의 활용
  - 암호키, 비밀번호, 해시값 등에서 발생 가능한 모든 결과 범위 정의
    - e.g., 4자리 숫자 비밀번호의 표본공간은 0000부터 9999까지이며, 총 10,000가지 결과로 구성
  - 가능한 암호키 전체로 구성된 키 공간 정의
    - e.g., 128비트 암호키의 표본공간은 가능한 모든 128비트 이진 문자열로 구성

표본공간(Sample Space)

- 예제 2.1

한 개의 주사위를 한 번 던지는 실험을 생각해 보자. 다음 각 경우의 표본공간을 구하시오.
1. 윗면에 나타난 숫자 자체에 관심을 가지는 경우
2. 윗면에 나타난 숫자가 짝수인지 홀수인지에만 관심을 가지는 경우

- 풀이
  1. 윗면에 나타날 수 있는 숫자는 $1, 2, 3, 4, 5, 6$이므로 $S_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
  2. 숫자의 구체적인 값이 아니라 짝수와 홀수만 구분하므로 $S_2 = \{\text{짝수}, \text{홀수}\}$

표본공간(Sample Space)

- 수형도(Tree Diagram) (1/2)
  - 정의
    - 통계적 실험에서 발생 가능한 결과를 나뭇가지 형태로 단계별로 나타내어, 표본공간을 구성하는 표본점을 확인하는 도표
  - 예제 2.2

한 개의 동전을 던져서 앞면이 나오면 다시 동전을 던지고, 뒷면이 나오면 한 개의 주사위를 던지는 실험의 수형도를 나타내고 표본공간을 구하시오.(H는 앞면, T는 뒷면)



<그림 1> 예제 2.2의 수형도

- 풀이
  - 첫 번째 동전의 결과에 따라 두 번째 시행이 달라지는 실험
  - 첫 번째 결과가 앞면 H이면 동전을 다시 던져 HH, HT 발생
  - 첫 번째 결과가 뒷면 T이면 주사위를 던져 $T1, T2, \ldots, T6$ 발생
  - 표본공간은 $S = \{HH,\ HT,\ T1,\ T2,\ T3,\ T4,\ T5,\ T6\}$임

표본공간(Sample Space)

- 수형도(Tree diagram) (2/2)
  - 예제 2.3

제조공정에서 임의로 세 개의 제품을 추출하여 순서대로 검사한다. 각 제품을 불량품이면 D, 양품이면 N으로 분류할 때, 가능한 모든 검사 결과를 수형도로 나타내고 표본공간 S를 구하시오.



<그림 2> 예제 2.3의 수형도

- 풀이
  - 각 제품의 검사 결과는 D또는 N의 두 가지이므로, 세 번의 검사에서 가능한 결과의 수는: $2 \times 2 \times 2 = 2^3 = 8$
  - 첫 번째 경로를 따라가면 세 제품이 모두 불량품인 표본점 DDD를 얻을 수 있으며, 나머지 경로도 같은 방법으로 확인 가능함
  - 표본공간은 $S = \{DDD, DDN, DND, DNN, NDD, NDN, NND, NNN\}$임

목 차

- 표본공간(Sample Space)
- 사상(Events)
- 경우의 수(Number of Cases)
- 사상의 확률(Probability)
- 가법정리(Additive Rule)
- 조건부 확률(Conditional Probability)
- 베이즈 정리(Bayes' Rule)

사상(Events)

- 정의
  - 표본공간 S에서 특정 조건을 만족하는 결과들로 이루어진 부분집합

- 사상의 연산 및 관계
  - 공집합(Empty Set)
  - 여집합(Complement)
  - 교집합(Intersection)
  - 합집합(Union)
  - 상호배반(Mutually exclusive or Disjoint)

사상(Events)

- 정보보호에서의 활용
  - 공격 성공 여부 정의
    - e.g., 공격자가 추측한 비밀번호가 실제 비밀번호와 일치하여 인증에 성공하는 결과를 사상 A로 정의
  - 침입 탐지 시스템의 탐지 결과 분석
    - e.g., 실제 공격 발생을 A, 경보 발생을 B라고 할 때, 사상의 교집합과 여사상을 이용하여 정상 탐지, 미탐, 오탐 등의 탐지 결과를 구분
  - 예제 2.4

전자부품의 수명 t를 년 단위로 측정할 때 표본공간이 $S = \{t | t \geq 0\}$ 으로 주어져 있다. 전자부품이 5년 이내에 고장 나는 사상 A를 집합으로 나타내고, A가 표본공간 S의 부분집합인지 확인하시오.

  - 풀이
    - 전자부품의 수명이 5년 이내라는 것은 수명 t가 0년 이상 5년 미만임을 의미하므로: $A = \{t | 0 \leq t < 5\}$
    - 따라서 전자부품이 5년 이내에 고장 나는 사상 A는 표본공간 S의 부분집합임

사상(Events)

- 벤 다이어그램(Venn Diagram)
  - 정의
    - 서로 다른 집합 또는 사상 사이의 관계를 도형으로 시각화한 그림
  - 특징
    - 표본공간, 교집합, 합집합, 여집합 및 상호배반 관계 표현에 활용



<그림 3> 벤 다이어그램 예시

사상(Events)

- 공집합(Empty Set)
  - 하나의 원소도 포함하고 있지 않은 집합
  - 표본공간에서 발생할 수 없는 결과를 나타내는 불가능 사상
    - e.g., 4자리 숫자 비밀번호에서 5자리 비밀번호가 생성되는 사상 A
      - 4자리로만 설정되어 있으므로 해당 결과는 발생할 수 없음($A = \emptyset$)
  - ∅로 표현됨
  - 예제 2.5

사상 B가 다음과 같이 주어졌을 때, 사상 B를 구하시오.
$B = \{x | \, x$는 7의 인수 중 짝수$\}$

- 풀이
  - 7의 인수는 1과 7이며, 그 중 짝수는 존재하지 않음($B = \emptyset$)

사상(Events)

- 여집합(Complement)
  - 표본공간 S에서 특정 사상 A에 속하지 않는 모든 결과의 집합
  - 사상 A가 발생하지 않는 경우를 의미
  - A^c 또는 A'로 표현됨
  - 예제 2.6

52장의 트럼프 카드 중 한 장을 임의로 뽑는 실험에서, 표본공간 S는 52장의 모든 카드로 구성된다. 붉은색 카드가 뽑히는 사상을 R이라고 할 때, 여사상 R'이 나타내는 사상을 구하시오.

  - 풀이
    - R'은 표본공간 S에서 사상 R에 포함되지 않는 모든 결과의 집합임
    - 따라서 R'은 붉은색 카드가 아닌 검은색 카드가 뽑히는 사상임



<그림 4> 예제 2.6의 벤 다이어그램

사상(Events)

- 교집합(Intersection)
  - 두 사상 A와 B에 공통으로 포함된 모든 결과의 집합
  - 두 사상이 동시에 발생하는 경우를 의미
  - $A \cap B$로 표현됨
  - 예제 2.7

어느 교실에서 학생 한 명을 임의로 선택한다. 다음과 같이 두 사상을 정의할 때, 교집합 $E \cap F$가 나타내는 사상을 설명하시오.

- E: 선택된 학생의 전공이 공학인 사상
- F: 선택된 학생이 여성인 사상

  - 풀이
    - $E \cap F$는 사상 E와 F가 동시에 발생하는 경우이므로, 선택된 학생이 여성이면서 공학을 전공하는 사상을 의미함



<그림 5> $A \cap B$의 벤 다이어그램

사상(Events)

- 합집합(Union)
  - 두 사상 A와 B 중 적어도 하나에 포함되는 모든 결과의 집합
  - 사상 A 또는 B가 발생하거나, 두 사상이 동시에 발생하는 경우까지 포함
  - $A \cup B$로 표현됨
  - 예제 2.8

$A = \{a, b, c\}, B = \{b, c, d, e\}$라 하면 $A \cup B$는 무엇인가?

- 풀이
  - $A \cup B = \{a, b, c, d, e\}$임



<그림 6> $A \cup B$의 벤 다이어그램

사상(Events)

- 상호배반(Mutually exclusive or Disjoint) (1/2)
  - 두 사상이 공통된 결과를 가지지 않아 동시에 발생할 수 없는 관계
  - 두 사상의 교집합이 공집합인 경우를 의미
  - $A \cap B = \emptyset$로 표현됨
  - 예제 2.9

알파벳 한 글자를 임의로 선택하는 실험에서 다음 두 사상이 주어져 있다.

$$V = \{a, e, i, o, u\}, C = \{l, r, s, t\}$$

두 사상 V와 C가 상호배반인지 판단하시오.

- 풀이
  - 두 사상의 공통 원소를 구하면, $V \cap C = \emptyset$
  - V와 C는 공통으로 포함하는 원소가 없어 동시에 발생할 수 없으므로 상호배반임



<그림 7> 예제 2.9 벤 다이어그램

사상(Events)

- 상호배반(Mutually exclusive or Disjoint) (2/2)
  - 예제 2.10

8개의 채널을 운영하는 한 유선방송회사가 있다. 이 중 3개 채널은 ABC, 2개 채널은 NBC, 1개 채널은 CBS 방송망에 속하며, 나머지 2개 채널은 각각 교육방송과 ESPN 스포츠 중계용이다.
가입자가 임의로 TV를 켰을 때,두 사상 A, B가 다음과 같을 때 상호배반인지 판단하시오.

- A: 선택된 프로그램이 NBC 방송망에 속하는 사상
- B: 선택된 프로그램이 CBS 방송망에 속하는 사상

  - 풀이
    - TV를 켰을 때 한 번에 하나의 채널만 선택되므로, 선택된 프로그램이 NBC와 CBS 방송망에 동시에 속할 수 없음
    - 따라서 두 사상은 공통된 결과를 가지지 않으므로, $A \cap B = \emptyset$ 상호배반 사상임



<그림 8> 예제 2.10 벤 다이어그램

사상(Events)

- 사상의 연산 및 관계 정리
  - 벤 다이어그램을 이용하여 여러 사상의 연산 결과와 포함 관계를 쉽게 확인 가능



- $A \cap B =$ 영역 1과 2
- $B \cap C =$ 영역 1과 3
- $A \cup C =$ 영역 1, 2, 3, 4 ,5 와 7
- $B' \cap A =$ 영역 4와 7
- $A \cap B \cap C =$ 영역 1
- $(A \cup B) \cap C' =$ 영역 2, 6 과 7

<그림 9> 사상 A, B, C의 벤 다이어그램

목 차

- 표본공간(Sample Space)
- 사상(Events)
- 경우의 수(Number of Cases)
- 사상의 확률(Probability)
- 가법정리(Additive Rule)
- 조건부 확률(Conditional Probability)
- 베이즈 정리(Bayes' Rule)

경우의 수(Number of Cases)

- 정의
  - 주어진 조건을 만족하는 표본점 또는 가능한 방법의 개수

- 계산 방법
  - 합의 법칙(Addition Rule)
  - 곱의 법칙(Multiplication Rule)
  - 순열(Permutation)
  - 분할(Partition)
  - 조합(Combination)

경우의 수(Number of Cases)

- 정보보호에서의 활용
  - 비밀번호 후보 수 계산
    - e.g., 4자리 숫자 비밀번호 $10^4 = 10{,}000$가지의 가능한 비밀번호로 구성
  - 암호키의 보안 강도 평가
    - e.g., 128비트 암호키의 가능한 키는 2^{128}가지이므로 전수조사 공격에 필요한 범위 파악 가능
  - 다단계 인증 방식의 조합 수 계산
    - e.g., 로그인 방식 2가지와 추가 인증 방식 3가지를 조합하면 $2 \times 3 = 6$가지 인증 과정 존재

경우의 수(Number of Cases)

- 합의 법칙(Addition Rule) (1/2)
  - 정의
    - 두 가지 이상의 방법 중 어느 하나를 선택하는 경우, 각 방법의 경우의 수를 더하여 전체 경우의 수를 구하는 법칙
  - 계산 방법
    - 두 사상 A와 B가 상호배반인 경우

$$n(A \cup B) = n_1 + n_2$$

    - 여러 사상이 서로 상호배반인 경우

$$n(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_k) = n_1 + n_2 + \cdots + n_k$$

경우의 수(Number of Cases)

- 합의 법칙(Addition Rule) (1/2)
  - 예제 2.11

한 카페에서 음료 한 잔을 선택하려고 한다. 커피 메뉴는 4가지, 차 메뉴는 3가지가 있을 때 선택할 수 있는 음료의 경우의 수를 구하시오.

  - 풀이
    - 커피 메뉴를 선택하는 경우의 수: 4가지
    - 차 메뉴를 선택하는 경우의 수: 3가지
    - 음료 한 잔만 선택하므로 커피와 차를 동시에 선택하지 않음
    - 따라서 합의 법칙을 적용하면 $4 + 3 = 7$, 7가지임

경우의 수(Number of Cases)

- 곱의 법칙(Multiplication Rule) (1/4)
  - 정의
    - 여러 단계의 선택이 차례로 이루어지는 경우, 각 단계에서 가능한 경우의 수를 곱하여 전체 경우의 수를 구하는 법칙
  - 계산 방법
    - 두 단계의 선택이 이루어지는 경우

$$n = n_1 \times n_2$$

    - 여러 단계의 선택이 이루어지는 경우

$$n = n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k$$

경우의 수(Number of Cases)

- 곱의 법칙(Multiplication Rule) (2/4)
  - 예제 2.12

한 쌍의 주사위를 한 번 던지는 경우 표본공간에는 얼마나 많은 표본점들이 존재하게 되는가?

- 풀이
  - 첫 번째 주사위로 인한 결과의 수: $n_1 = 6$
  - 두 번째 주사위로 인한 결과의 수: $n_2 = 6$
  - 따라서 한 쌍의 주사위를 한 번 던지는 경우 표본점의 수는: $n_1 \times n_2 = 36$

경우의 수(Number of Cases)

- 곱의 법칙(Multiplication Rule) (3/4)
  - 예제 2.13

한 아파트를 선택할 때 외관 디자인은 4가지, 내부 평면 구조는 3가지 중에서 각각 하나씩 선택할 수 있다. 선택 가능한 아파트 유형의 경우의 수를 구하시오.

  - 풀이
    - 외관 디자인을 선택하는 경우의 수: $n_1 = 4$
    - 내부 평면 구조를 선택하는 경우의 수: $n_2 = 3$
    - 외관 디자인과 내부 구조를 각각 하나씩 선택하므로: $n_1 \times n_2 = 12$

경우의 수(Number of Cases)

- 곱의 법칙(Multiplication Rule) (4/4)
  - 예제 2.14

22명의 클럽 회원 중에서 회장과 총무를 선임할 수 있는 방법의 수는 몇 가지인가?

    - 풀이
      - 회장 자리에 가능한 가짓수는 22가지이고 이 각각의 가짓수마다 총무를 선임할 수 있는 가짓수는 21가지임
      - 따라서 가능한 총 가짓수는: $22 \times 21 = 462$
  - 예제 2.15

샘이 컴퓨터를 조립하려고 한다. CPU는 2개 회사, 하드 디스크는 4개 회사, 메모리는 3개 회사, 액세서리는 5개 상점으로부터 주문할 수 있다면, 샘이 부품을 주문할 수 있는 총 가짓수는 얼마인가?

    - 풀이
      - 각각 순서대로 n_1, n_2, n_3, n_4라고 가정
      - 가능한 총 가짓수는: $n_1 \times n_2 \times n_3 \times n_4 = 2 \times 4 \times 3 \times 5 = 120$

경우의 수(Number of Cases)

- 순열(Permutation) (1/5)
  - 정의
    - 서로 다른 원소 중 일부 또는 전부를 선택하여, 순서를 고려해 배열하는 경우의 수를 구하는 방법
  - 계산 방법
    - 서로 다른 n개의 대상을 모두 나열하는 경우

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 2 \times 1$$

      - $n = 0$인 경우에는 $0! = 1$로 정의
    - 서로 다른 n개의 대상 중 r개를 선택하여 순서대로 나열하는 경우

$$_{\mathrm{n}}P_{\mathrm{r}} = \frac{n!}{(n-r)!}$$

경우의 수(Number of Cases)

- 순열(Permutation) (2/5)
  - 예제 2.16

3개의 영문자 a,b,c에 대한 순열의 수는 몇 개인가?

    - 풀이
      - 첫 번째 위치에 올 수 있는 문자의 수: $n_1 = 3$
      - 두 번째 위치에 올 수 있는 문자의 수: $n_2 = 2$
      - 세 번째 위치에 올 수 있는 문자의 수: $n_3 = 1$
      - 따라서 전체 가짓수는: $n_3 \times n_2 \times n_1 = 6$
  - 예제 2.17

통계학과 25명의 대학원생들을 대상으로 세 가지 상(연구, 교육, 봉사)을 주려고 한다. 한 사람당 최대 한 개의 상만 받을 수 있다고 할 때, 상을 수여하는 방법은 총 몇가지나 되겠는가?

    - 풀이
      - 상의 종류가 다르므로 이것은 순열 문제임
      - 가능한 총 가짓수는: $_{25}P_3 = \frac{25!}{(25-3)!} = \frac{25!}{22!} = 25 \times 24 \times 23 = 13{,}800$

경우의 수(Number of Cases)

- 순열(Permutation) (3/5)
  - 원순열(Circular permutation)
    - 정의
      - 서로 다른 원소를 원형으로 배열하는 방법
    - 계산 방법
      - 회전하여 일치하는 배열은 동일하게 간주하므로, $n!$을 n으로 나눔

$$\frac{n!}{n} = (n-1)! = (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 2 \times 1$$

    - 예제 2.18

네 사람을 원형 탁자에서 카드놀이를 할 경우 자리에 앉는 경우의 수를 구하시오

      - 풀이
        - 원형 배열에서는 전체 배열을 회전하여 일치하는 경우를 동일한 배열로 간주함
        - 한 사람을 기준으로 고정하고, 나머지 사람을 배치하는 경우의 수를 구하면 됨
        - 따라서 총 가짓수는: $(4-1)! = 6$

경우의 수(Number of Cases)

- 순열(Permutation) (4/5)
  - 같은 것을 포함하는 순열 (1/2)
    - 정의
      - 일부 대상이 서로 같은 경우, 같은 대상을 서로 바꾸어도 동일한 배열로 간주하여 나열하는 방법
    - 계산 방법
      - 전체 n개의 대상 중 같은 대상이 각각 $n_1, n_2, \ldots, n_k$개씩 있는 경우

$$\frac{n!}{n_1!\, n_2! \cdots n_k!}$$

    - 예제 2.19

대학 축구선수 10명을 일렬로 세우려고 한다. 이들 10명을 학년으로 구분했을 때 1학년이 1명, 2학년이 2명, 3학년이 4명, 4학년이 3명이라면, 이들을 학년만을 구분하여 일렬로 세울 수 있는 방법은 몇 가지나 되겠는가?

      - 풀이
        - 같은 학년끼리는 서로 자리를 바꾸어도 학년 배열이 달라지지 않으므로 수식을 이용해 풀어보면: $\frac{10!}{1!2!4!3!} = 12{,}600$

경우의 수(Number of Cases)

- 순열(Permutation) (5/5)
  - 같은 것을 포함하는 순열 (2/2)
    - 예제 2.20

STATISTICS라는 단어의 문자들로 만들 수 있는 가능한 배열의 가짓수는 얼마인가?

- 풀이
  - 10개의 문자 중 S와 T는 세 번, I는 두 번, A와 C는 각각 한 번씩 나타남
  - 공식을 이용하면: $\binom{10}{3,3,2,1,1} = \frac{10!}{3!3!2!1!1!} = 50{,}400$

경우의 수(Number of Cases)

- 분할(Partition)
  - 정의
    - 서로 다른 n개의 원소를 서로 겹치지 않는 여러 부분집합으로 나누는 경우의 수를 구하는 방법
  - 계산 방법
    - 전체 n개의 대상을 각각 $n_1, n_2, \ldots, n_r$개의 원소 이루어진 부분집합으로 나누는 경우(단, $n_1 + n_2 + \cdots + n_r = n$)

$$\binom{n}{n_1, n_2, \cdots, n_r} = \frac{n!}{n_1!\, n_2! \cdots n_r!}$$

  - 예제 2.21

7명의 대학원생을 3인용 객실 하나와 2인용 객실 둘에 투숙시키는 방법은 몇 가지 인가?

    - 풀이
      - 가능한 분할의 총 가짓수는: $\binom{7}{3, 2, 2} = \frac{7!}{3!2!2!} = 210$

경우의 수(Number of Cases)

- 조합(Combination)
  - 정의
    - 서로 다른 n개의 원소 중 r개를 선택할 때, 순서를 고려하지 않는 경우의 수를 구하는 방법
  - 계산 방법

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!\,(n-r)!} = {}_{\mathrm{n}}C_r$$

  - 예제 2.22

한 소년이 5가지의 컴퓨터 게임을 사려고 한다. 10개의 아케이드 게임 중에서 3게임, 5개의 스포츠 게임 중에서 2게임을 선택하는 방법은 모두 몇 가지인가?

    - 풀이
      - 10개의 아케이드 게임 중 3게임을 고르는 가짓수는 $\frac{10!}{3!(10-3!)} = 120$
      - 5개의 스포츠 게임 중 2게임을 고르는 가짓수는 $\frac{5!}{2!(5-2!)} = 10$
      - 곱의 법칙을 이용하면 $120 \times 10 = 1200$ 가지 방법이 존재함

경우의 수(Number of Cases)

- 계산 방법 정리

구분	적용 상황	계산 방법
합의 법칙	여러 방법 중 하나를 선택하는 경우	$n_1 + n_2 + \cdots + n_k$
곱의 법칙	여러 단계의 선택이 차례로 이루어지는 경우	$n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k$
순열	서로 다른 n개의 원소 중 r개를 배열하는 경우	${}_{\mathrm{n}}P_{\mathrm{r}} = \frac{n!}{(n-r)!}$
원순열	서로 다른 n개의 원소를 원형으로 배열하는 경우	$\frac{n!}{n} = (n-1)!$
같은 것을 포함하는 순열	같은 원소가 포함된 n개의 원소를 배열하는 경우	$\frac{n!}{n_1!\,n_2!\cdots n_k!}$
분할	서로 다른 n개의 원소를 정해진 크기의 부분집합으로 나누는 경우	$\binom{n}{n_1, n_2, \cdots, n_r} = \frac{n!}{n_1!\,n_2!\cdots n_r!}$
조합	서로 다른 n개의 원소 중 r개를 선택하는 경우	$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!\,(n-r)!} = {}_{\mathrm{n}}C_r$

목 차

- 표본공간(Sample Space)
- 사상(Events)
- 경우의 수(Number of Cases)
- 사상의 확률(Probability)
- 가법정리(Additive Rule)
- 조건부 확률(Conditional Probability)
- 베이즈 정리(Bayes' Rule)

사상의 확률(Probability)

- 정의
  - 특정 사상이 발생할 가능성을 0과 1사이의 수로 나타낸 값
- 특징
  - 각 표본점에 부여된 확률을 가중치(Weight)라고 표현함
  - 사상 A의 확률은 사상 A에 포함된 모든 표본점들의 가중치의 합임
    - $0 \leq P(A) \leq 1, P(\emptyset) = 0, P(S) = 1$
  - $A_1,\ A_2,\ A_3, \cdots$가 서로 배반인 경우, 확률을 더하여 계산함
    - $P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \cdots) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + \cdots$
  - 전체 N개의 결과가 동일한 확률로 발생하고, 사상 A가 그 중 n개의 표본점을 포함하는 경우
    - $P(A) = \frac{n}{N}$

사상의 확률(Probability)

- 정보보호에서의 활용
  - 특정 보안 사상이 발생할 가능성을 수치로 나타내기 위함
    - e.g., 비밀번호 추측 공격의 성공 확률 계산
  - 여러 보안 사상의 발생 가능성을 비교하기 위함
    - e.g., 취약점별 악용 가능성을 비교하여 우선 패치 대상 결정
- 예제 2.23

하나의 동전을 두 번 던지는 실험에서 적어도 한 번은 앞면이 나올 확률은? (H는 앞면, T는 뒷면)

  - 풀이
    - 표본공간 $S = \{HH, HT, TH, TT\}$
    - 동전의 앞면과 뒷면의 발생확률이 같다고 가정하고, 각 표본점에 확률 w를 할당하면 $w = \frac{1}{4}$
    - A를 적어도 한 번의 앞면이 나올 사상이라고 한다면 $A = \{HH, HT, TH\}$
    - 따라서 $P(A) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

사상의 확률(Probability)

- 예제 2.24

짝수가 홀수보다 2배만큼 더 발생하는 주사위가 있다.그 주사위를 한 번 던져 4보다 작은 수가 나올 사상을 E라할 때, $P(E)$를 구하여라

  - 풀이
    - 표본공간은 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$이고 각 홀수에는 w,각 짝수에는 $2w$의 확률을 할당하면, 확률의 합이 1이 되어야 하므로 $9w = 1$, 즉 $w = \frac{1}{9}$
    - 따라서 각 홀수가 나올 확률은 $\frac{1}{9}$, 각 짝수가 나올 확률은 $\frac{2}{9}$임
    - $E = \{1, 2, 3\}$이므로 $P(E) = \frac{1}{9} + \frac{2}{9} + \frac{1}{9} = \frac{4}{9}$ 임

사상의 확률(Probability)

- 예제 2.25

앞 예제에서 짝수가 나타날 사상을 A, 3으로 나누어질 수 있는 수가 나타날 사상을 B라고 할 때 $P(A \cup B)$와 $P(A \cap B)$를 구하시오.

  - 풀이
    - $A = \{2,4,6\},\ B = \{3,6\}$이므로, $A \cup B = \{2,3,4,6\}$이고, $A \cap B = \{6\}$임
    - 따라서 $P(A \cup B) = \frac{2}{9} + \frac{1}{9} + \frac{2}{9} + \frac{2}{9} = \frac{7}{9}$, $P(A \cap B) = \frac{2}{9}$임

- 예제 2.26

25명의 산업공학, 10명의 기계공학, 10명의 전기공학, 8명의 토목공학 학생들로 구성된 통계학 수업이 있다. 이 중 1명의 학생을 임의로 뽑을 때 그 학생이 (a)산업공학 학생, (b)토목공학이나 전기 공학 학생일 확률을 각각 구하여라

  - 풀이
    - 총 53명의 산업, 기계, 전기, 토목공학 학생을 각각 I, M, E, C로 표현함
    - (a) 53명 중 산업공학 학생은 25명이므로 $P(I) = \frac{25}{53}$
    - (b) 토목공학이나 전기공학 학생은 모두 18명이므로 $P(C \cup E) = \frac{18}{53}$

사상의 확률(Probability)

- 접근법 (1/3)
  - 정의
    - 사상의 확률을 어떤 기준과 방법으로 결정하거나 해석할 것인지를 나타내는 방식
  - 종류
    - 상대도수 접근법(Relative Frequency Approach)
    - 무차별 접근법(Indifference Approach)
    - 주관적 접근법(Subjective Approach)

사상의 확률(Probability)

- 접근법 (2/3)

*상대도수:전체시행 횟수 중 특정 사상이 발생한 횟수의 비율

  - 상대도수 접근법(Relative Frequency Approach)
    - 동일한 실험을 반복할 때, 시행 횟수가 증가함에 따라 특정 사상의 상대도수가 안정되는 값을 확률로 해석하는 방법
    - 동일한 시행을 반복할 수 있고 충분한 관측 자료가 존재하는 경우 사용
      - e.g., 동전을 $1{,}000$번 던져 앞면이 503번 나온 경우, 앞면의 상대도수는 $\frac{503}{1000} = 0.503$
  - 무차별 접근법(Indifference Approach)
    - 모든 표본점의 발생 가능성이 같다고 가정하고, 전체 표본점 중 해당 사상에 포함된 표본점의 비율로 확률을 구하는 방법
    - 표본점의 발생 가능성이 동일하다고 가정할 수 있는 경우 사용
      - e.g., 공정한 주사위에서는 $1, 2, 3, 4, 5, 6$이라는 각 표본점의 확률이 모두 $\frac{1}{6}$이고, 짝수 사상 $\{2, 4, 6\}$의 확률은 $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

사상의 확률(Probability)

- 접근법 (3/3)
  - 주관적 접근법(Subjective Approach)
    - 과거 자료, 경험, 전문 지식 등을 바탕으로 개인이 판단한 발생 가능성을 확률로 표현하는 방법
    - 관측 자료가 부족하여 전문가의 경험과 판단이 필요한 경우 사용
      - e.g., 보안 전문가가 취약점 정보와 과거 공격 사례를 바탕으로 랜섬웨어 공격 발생 확률을 70%로 평가

목 차

- 표본공간(Sample Space)
- 사상(Events)
- 경우의 수(Number of Cases)
- 사상의 확률(Probability)
- 가법정리(Additive Rule)
- 조건부 확률(Conditional Probability)
- 베이즈 정리(Bayes' Rule)

가법정리(Additive Rule)

- 정의
  - 사상 A또는 B중 적어도 하나가 발생할 확률을 구하는 정리
- 계산 방법
  - 두 사상 A와 B중 적어도 하나가 발생할 확률
    $$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$
  - 두 사상 A와 B가 상호배반인 경우
    $$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$
  - $A_1, A_2, \ldots, A_n$이 표본공간 S를 분할하는 경우
    $$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n) = P(S) = 1$$
  - 사상을 A, B, C 세 개로 확장한 경우
    $$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(A \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$
  - 만약 사상 A와 A'가 서로 여집합 관계에 있는 경우
    $$P(A) + P(A') = 1$$

가법정리(Additive Rule)

- 예제 2.27

졸업을 앞둔 존이 두 회사에 입사면접을 본 결과, 회사 A에 합격할 확률은 0.8, 회사 B에 합격할 확률은 0.6, 두 회사에 모두 합격할 확률은 0.5로 판단된다. 이 두 회사 중 최소한 한 회사에 합격할 확률은 얼마인가?

  - 풀이
    - 가법정리를 이용하면: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.8 + 0.6 - 0.5 = 0.9$

- 예제 2.28

한 쌍의 주사위를 던졌을 때 나타난 두 눈의 합이 7이나 11이 될 확률은 얼마인가?

  - 풀이
    - 눈의 합이 7이 될 사상을 A, 11이 될 사상을 B라 하면, 합이 7이 되는 경우는 36개의 표본점 중 6가지이고, 합이 11이 될 사상은 2가지 경우가 존재함
    - 모든 표본점의 발생확률이 동일하므로 $P(A) = \frac{1}{6}$, $P(B) = \frac{1}{18}$
    - 합이 7이 되는 경우와 11이 되는 경우는 동시에 발생할 수 없으므로 A와 B는 서로 배반임
    - 따라서 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{1}{6} + \frac{1}{18} = \frac{2}{9}$ 임

가법정리(Additive Rule)

- 예제 2.29

새 자동차를 사려고 하는 어느 고객이 녹색,백색,적색,혹은 흑색의 자동차를 구입할 확률이 각각 0.09,0.15,0.21,0.23이라고 할 때, 그 고객이 네 가지 색 중 어느 한 가지 색의 차를 구입할 확률은 얼마인가?

  - 풀이
    - 고객이 녹색, 백색, 적색, 흑색의 차를 구입할 사상을 각각 G, W, R, B라 하면, 이 네 사상은 서로 배반이므로 구하는 확률은 $P(G \cup W \cup R \cup B) = P(G) + P(W) + P(R) + P(B)$
    - $0.09 + 0.15 + 0.21 + 0.23 = 0.68$

- 예제 2.30

어떤 자동차 정비공이 하루 동안 정비하는 자동차의 수가 $3, 4, 5, 6, 7$ 혹은 8대 이상이 될 확률이 각각 $0.12, 0.19, 0.28, 0.24, 0.10, 0.07$이라고 할 때, 그가 다음번 작업일에 적어도 5대 이상을 정비할 확률은 얼마인가?

  - 풀이
    - 적어도 5대의 차를 수리할 사상을 E라 하면 $P(E) = 1 - P(E')$이며 여기서 E'는 5대 미만의 차를 수리할 사상임
    - $P(E') = 0.12 + 0.19 = 0.31$이므로 가법정리에 의해 $P(E) = 1 - 0.31 = 0.69$

목 차

- 표본공간(Sample Space)
- 사상(Events)
- 경우의 수(Number of Cases)
- 사상의 확률(Probability)
- 가법정리(Additive Rule)
- 조건부 확률(Conditional Probability)
- 베이즈 정리(Bayes' Rule)

조건부 확률(Conditional Probability)

- 정의
  - 사상 A가 발생했다는 조건에서 사상 B가 발생할 확률
- 계산 방법
  - 사상 A가 발생하면 표본공간이 S에서 A로 제한되고, 그 중 사상 B도 발생하는 결과는 $A \cap B$이므로 다음과 같이 유도됨

$$P(B \mid A) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)} = \frac{n(A \cap B)/n(S)}{n(A)/n(S)} = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, \qquad P(A) > 0$$

- 정보보호에서의 활용
  - 특정 조건이나 증거가 주어졌을 때 보안 사고의 발생 가능성을 판단하기 위함
    - e.g., 비정상 로그인 기록이 관찰된 경우 계정 탈취 확률 계산

조건부 확률(Conditional Probability)

- 예제 2.31

정규스케줄에 따라 비행기가 정시에 출발할 확률은 $P(D) = 0.83$이고, 정시에 도착할 확률은 $P(A) = 0.82$이며, 정시에 출발하여 정시에 도착할 확률은 $P(D \cap A) = 0.78$라 하자.

a. 비행기가 정시에 출발했을 때 정시에 도착할 확률을 구하여라

b. 비행기가 정시에 도착했을 때 정시에 출발했을 확률을 구하여라

- 풀이

a. $P(A|D) = \frac{P(D \cap A)}{P(D)} = \frac{0.78}{0.83} = 0.94$

b. $P(D|A) = \frac{P(A \cap D)}{P(A)} = \frac{0.78}{0.82} = 0.95$

- 예제 2.32

옷감의 10%는 길이불량, 5%는 직조불량, 0.8%는 두 불량 모두를 가지고 있다고 한다. 생산된 옷감 하나를 임의로 선택하여 검사한 결과가 길이불량이었다고 할 때, 이것이 직조불량일 확률은 얼마인가?

- 풀이
  - 길이불량일 사상을 L, 직조불량일 사상을 T라고 하면 길이불량이었을 때 직조불량일 확률은

$$P(T|L) = \frac{P(T \cap L)}{P(L)} = \frac{0.008}{0.1} = 0.08$$

조건부 확률(Conditional Probability)

- 독립사상(Independent Event)
  - 정의
    - 한 사상의 발생 여부가 다른 사상의 발생 확률에 영향을 주지 않는 두 사상
  - 독립 조건
    - $P(B \mid A) = P(B),\ P(A \mid B) = P(A)$ 혹은 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$
  - 예제 2.33

동전을 두 번 던진다. 다음과 같이 사상 A와 B를 정의할 때, 두 사상이 독립인지 판단하시오.

- A: 첫 번째 던지기에서 앞면이 나오는 사상, B: 두 번째 던지기에서 앞면이 나오는 사상

1. $P(A)$와 $P(B)$를 구하시오,
2. $P(A \cap \mathrm{B})$를 구하고, $P(A \cap B) = P(A)P(B)$가 성립하는지 확인하여 독립 여부를 판단하시오.

- 풀이
  1. $P(A) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2},\ P(B) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$
  2. 사상 $A \cap B$는 첫 번째와 두 번째 모두 앞면이 나오는 경우이므로 $P(A \cap \mathrm{B}) = \frac{1}{4}$
     또한 $P(A)P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$이므로 독립임

조건부 확률(Conditional Probability)

- 종속사상(Dependent Event)
  - 정의
    - 한 사상의 발생 여부가 다른 사상의 발생 확률에 영향을 주는 두 사상
  - 종속 조건
    - $P(B\,|A) \neq P(B)$, $P(A\,|B) \neq P(A)$ 혹은 $P(A \cap B) \neq P(A)P(B)$
  - 예제 2.34

주머니에 빨간 공 3개와 파란 공 2개가 있다. 공을 한 개 뽑은 뒤 다시 넣지 않고 두 번째 공을 뽑는다. 다음과 같이 사상 A와 B를 정의할 때, 두 사상이 종속인지 판단하시오.(A: 첫 번째에 빨간 공을 뽑는 사상, B: 두 번째에 빨간 공을 뽑는 사상)

1. $P(A)$와 $P(B)$를 구하시오
2. $P(A \cap B)$를 구하고, $P(A \cap B) = P(A)P(B)$가 성립하는지 확인하여 종속 여부를 판단하시오

- 풀이
  1. $P(A) = \frac{3}{5},\ P(B) = \frac{3}{5}$
  2. 첫 번째에 빨간 공을 뽑은 뒤에는 빨간 공 2개를 포함한 공 4개가 남으므로 $P(B\mid A) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, 따라서 $P(A \cap B) = \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{10}$ 또한 $\frac{3}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{9}{25}$ 이므로 $\frac{3}{10} \neq \frac{9}{25}$ 이므로 종속

조건부 확률(Conditional Probability)

- 승법정리(Multiplication Rule) (1/4)
  - 정의
    - 두 사상 A와 B가 모두 발생할 확률을 한 사상의 확률과 다른 사상의 조건부 확률의 곱으로 구하는 정리
  - 계산 방법
    - 두 사상의 경우

$$P(A \cap B) = P(A)P(B \mid A) = P(B)P(A \mid B)$$

    - 여러 사상으로 확장한 경우

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_k) = P(A_1)P(A_2 \mid A_1) \times P(A_3 \mid A_1 \cap A_2) \times \cdots \times P(A_k \mid A_1 \cap \cdots \cap A_{k-1})$$

    - 두 사상이 독립인 경우

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

조건부 확률(Conditional Probability)

- 승법정리(Multiplication Rule) (2/4)
  - 예제 2.35

20개의 퓨즈가 들어 있는 상자가 있는데, 그 중 5개가 불량품이라고 가정하자. 이 상자로부터 2개의 퓨즈를 연속적을 비복원 추출한다고 할 때, 2개의 퓨즈가 모두 불량품일 확률은 얼마인가?

- 풀이
  - 첫 번째 퓨즈가 불량품일 사상을 A, 두 번째 퓨즈가 불량품일 사상을 B라고 가정
  - $A \cap B$는 A가 일어나고 그 뒤에 B가 일어나는 사상이라고 해석 가능함
  - 첫 번째 퓨즈가 불량품일 확률은$\frac{1}{4}$, 두 번째 퓨즈가 불량품일 확률은 $\frac{4}{19}$가 됨
  - 따라서, $P(A \cap B) = \left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{4}{19}\right) = \frac{1}{19}$

조건부 확률(Conditional Probability)

- 승법정리(Multiplication Rule) (3/4)
  - 예제 2.36

첫 번째 가방에는 4개의 흰 공과 3개의 검은 공이 들어있고 두 번째 가방에는 3개의 흰 공과 5개의 검은 공이 들어있다고 가정할 때 첫 번째 가방에서 공 하나를 꺼낸 후 보지 않고 두 번째 가방에 넣은 후, 두 번째 가방에서 검은 공을 꺼낼 확률은?

- 풀이
  - 첫 번째 가방에서 검은 공을 뽑을 사상을 B_1,두 번째 가방에서 검은 공을 뽑을 사상을 B_2, 첫 번째 가방에서 흰 공을 뽑을 사상을 W_1이라고 가정
  - 모든 경우는 배반적인 두 사상 $(B_1 \cap B_2)$와 $(W_1 \cap B_2)$이므로 구하고자 하는 확률은: $P(B_1 \cap B_2)$ 또는 $(W_1 \cap B_2) = P(B_1 \cap B_2) + P(W_1 \cap B_2) = P(B_1)P(B_2 \mid B_1) + P(\mathrm{W}_1)P(B_2 \mid W_1) = \left(\frac{3}{7}\right)\left(\frac{6}{9}\right) + \left(\frac{4}{7}\right)\left(\frac{5}{9}\right) = \frac{38}{63}$
  - 따라서 검은 공을 꺼낼 확률은 $\frac{38}{63}$ 임

조건부 확률(Conditional Probability)

- 승법정리(Multiplication Rule) (4/4)
  - 예제 2.37

어느 조그만한 도시에는 비상시에 대비해 소방차 한 대와 앰블런스 한 대를 보유하고 있다. 소방차가 필요할 때 바로 사용할 수 있을 확률이 0.98이고, 앰블런스가 필요할 때 바로 사용할 수 있을 확률이 0.92라고 한다. 화재가 나서 부상자가 발생했을 때 소방차와 앰블런스를 모두 사용할 수 있는 확률을 구하라.

    - 풀이
      - 소방차와 앰블런스의 사용가능한 사상을 각각 A, B라 가정
      - $P(A \cap B) = P(A)P(B) = (0.98)(0.92) = 0.9016$
  - 예제 2.38

한 벌의 카드에서 3장의 카드를 연속적으로 비복원추출하는 실험에서 첫 번째 카드가 붉은색 A일 사상을 A_1, 두 번째 카드가 10이나 J일 사상을 A_2, 세 번째 카드가 3보다 크고 7보다 작은 사상을 A_3라 할 때, 사상 $A_1 \cap A_2 \cap A_3$가 일어날 확률은?

    - 풀이
      - $P(A_1) = \frac{2}{52}, P(A_2 \mid A_1) = \frac{8}{51}$, $P(A_3 \mid A_1 \cap A_2) = \frac{12}{50}$ 임
      - $P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1)P(A_2 \mid A_1)P(A_3 \mid A_1 \cap A_2) = (\frac{2}{52})(\frac{8}{51})(\frac{12}{50}) = \frac{8}{5525}$

목 차

- 표본공간(Sample Space)
- 사상(Events)
- 경우의 수(Number of Cases)
- 사상의 확률(Probability)
- 가법정리(Additive Rule)
- 조건부 확률(Conditional Probability)
- 베이즈 정리(Bayes' Rule)

베이즈 정리(Bayes' Rule)

- 전확률의 정리(Theorem of Total Probability) (1/2)
  - 정의
    - 표본공간 S를 서로 배반인 사상들로 분할하고, 각 사상의 확률과 그 조건에서 A가 발생할 조건부확률을 이용하여 A의 전체 확률을 구하는 정리
  - 계산 방법
    - 사상 $B_1, B_2, \cdots, B_k$를 표본공간 S의 분할이고, $P(B_i) > 0$일 때, 임의의 사상 A는 서로 배반인 $A \cap B_i$들로 분할되므로 다음과 같이 유도됨

$$P(A) = P(A \cap B_1) + P(A \cap B_2) + \cdots + P(A \cap B_k) = P(B_1)P(A \mid B_1) + \cdots + P(B_k)P(A \mid B_k) = \sum_{i=1}^{k} P(B_i)P(A \mid B_i)$$



<그림 10> 전확률의 정리

베이즈 정리(Bayes' Rule)

- 전확률의 정리(Theorem of Total Probability) (2/2)
  - 예제 2.39

3대의 기계 B_1, B_2, B_3가 각각 전체 생산량의 $30\%, 45\%, 25\%$를 생산하는 어느 조립 공장에서 각 기계의 불량품 제조율이 $2\%, 3\%, 2\%$라면, 완제품 중에서 하나를 선택했을 때,그것이 불량품일 확률은 얼마인가?

- 풀이
  - A: 그 제품이 불량품일 사상
  - B_1: 그 제품이 B_1에서 제조되었을 사상
  - B_2: 그 제품이 B_2에서 제조되었을 사상
  - B_3: 그 제품이 B_3에서 제조되었을 사상
  - 전확률 정리를 이용: $P(A) = P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) + P(B_3)P(A|B_3)$

$$= (0.3)(0.02) + (0.45)(0.03) + (0.25)(0.02)$$

$$= 0.0245$$



<그림 11> 예제 2.39, 2.40 표본공간

베이즈 정리(Bayes' Rule)

- 정의
  - 관찰된 결과 A를 바탕으로, 전확률의 정리를 이용하여 원인 B_r이 발생했을 조건부확률을 계산하는 정리
- 계산 방법
  - 조건부확률과 승법정리를 적용하고, 분모 $P(A)$에 전확률의 정리를 대입하면 다음과 같이 유도됨

$$P(B_r \mid A) = \frac{P(B_r \cap A)}{P(A)} = \frac{P(B_r)P(A \mid B_r)}{P(A)} = \frac{P(B_r)P(A \mid B_r)}{\sum_{i=1}^{k} P(B_i)P(A \mid Bi)}$$

- 정보보호에서의 활용
  - 로그인 기록, 탐지 경고 등의 새로운 보안 증거를 반영하여 공격 원인의 확률을 갱신
    - e.g., 침입 탐지 경고가 발생했을 때 기존 침입 발생률, 탐지율, 오탐률을 이용하여 실제 침입일 확률 계산

베이즈 정리(Bayes' Rule)

- 예제 2.40

3대의 기계 B_1, B_2, B_3가 각각 전체 생산량의 $30\%, 45\%, 25\%$를 생산하는 어느 조립 공장에서 각 기계의 불량품 제조율이 $2\%, 3\%, 2\%$이다. 임의로 선택된 제품이 불량품이라고 알려졌을 때, 그 제품이 기계 B_3에서 제조되었을 확률은 얼마인가?

- 풀이
  - A: 그 제품이 불량품일 사상
  - B_1: 그 제품이 B_1에서 제조되었을 사상
  - B_2: 그 제품이 B_2에서 제조되었을 사상
  - B_3: 그 제품이 B_3에서 제조되었을 사상
  - 베이즈 정리를 이용하면:

$$P(B_3 \mid A) = \frac{P(B_3)P(A \mid B_3)}{P(B_1)P(A \mid B_1) + P(B_2)P(A \mid B_2) + P(B_3)P(A \mid B_3)}$$

$$= \frac{0.005}{0.006 + 0.0135 + 0.005} = \frac{0.005}{0.0245} = \frac{10}{49}$$



<그림 12> 예제 2.39, 2.40 표본공간

베이즈 정리(Bayes' Rule)

- 예제 2.41

임의로 선택한 한 제품의 결과가 불량인 경우,어느 분석법을 사용했을 가능성이 가장 많은 확률은 무엇인가?

- 조건 1: 제품 개발 시 분석법 $1, 2, 3$을 제품의 $30\%, 20\%, 50\%$에 각각 적용함
- 조건 2: 불량률은 각각 $P(D|P_1) = 0.01,\ P(D|P_2) = 0.03, P(D|P_3) = 0.02$

  - 풀이
    - 구해야 할 확률은 $P(P_1|\,D),\ P(P_2|\,D), P(P_3|\,D)$임
    - $P(P_1|\,D) = \dfrac{P(P_1)P(D\,|\,P_1)}{P(P_1)P(D\,|\,P_1)+P(P_2)P(D\,|\,P_2)+P(P_3)P(D\,|\,P_3)}$
      $= \dfrac{(0.03)(0.01)}{(0.3)(0.01)+(0.2)(0.03)+(0.5)(0.02)} = \dfrac{0.003}{0.019} = 0.158$
    - 같은 방식으로 계산하면 $P(P_2|\,D) = 0.316$, $P(P_3|\,D) = 0.526$이 나옴
    - 따라서 분석법 3을 사용했을 가능성이 큼



<그림 13> 예제 2.41 표본공간

Thanks!

김 민 식(minsik@pel.sejong.ac.kr)