2026/09/28, 2026 확률 기초 세미나

이공학도를 위한 확률 및 통계학

-6장 연속형 균일분포-

서 진 우(jinwoo@pel.sejong.ac.kr)

세종대학교 프로토콜공학연구실

목 차


- 연속형 균일분포
- 정규분포와 표준정규분포
- 이항분포의 정규근사
- 감마분포와 지수분포
- 카이제곱분포와 베타분포
- 로그정규분포
- 와이블 분포

목 차

- 연속형 균일분포
- 정규분포와 표준정규분포
- 이항분포의 정규근사
- 감마분포와 지수분포
- 카이제곱분포와 베타분포
- 로그정규분포
- 와이블 분포

연속형 균일분포

- 연속형 균일분포 (1/3)
  - 정의
    - 특정 구간 내 모든 실수에 대해 균일한 확률을 가지는 분포
    - 구간 $[A, B]$에서 정의되는 연속형 균일확률변수 X의 밀도함수
      - $f(x; A, B) = \begin{cases} \frac{1}{B-A}, & A \leq X \leq B \\ 0, & \text{그 외의 경우} \end{cases}$
  - 특징 (1/2)
    - 직사각형 분포(Rectangular Distribution)이라고 불림
      - 밑변이 $B - A$, 높이는 $\frac{1}{B-A}$
      - 닫힌 구간($[A, B]$)이 아닌, 열린 구간((A, B))에서도 가능
    - $[A, B]$ 내 특정 구간에 속할 확률은 구간 길이 동일 시, 모두 동일



<그림 1> 연속형 균일분포

연속형 균일분포


- 연속형 균일분포 (2/3)
  - 특징 (2/2)
    - 평균 $\mu = \frac{A+B}{2}$, 분산 $\sigma^2 = \frac{(B-A)^2}{12}$을 가짐
      - $f(x) = \frac{1}{B-A}$이므로 평균 $\mu = \int_A^B xf(x)\,dx = \frac{1}{B-A}\int_A^B x\,dx = \frac{1}{B-A}\left[\frac{x^2}{2}\right]_A^B$
        $= \frac{1}{B-A} \times \frac{B^2-A^2}{2} = \frac{A+B}{2}$
      - $f(x) = \frac{1}{B-A}, \mu = \frac{A+B}{2}$이므로 분산 $\sigma^2 = E[(X-\mu)^2]$
        $= \int_A^B (x-\mu)^2 f(x)\,dx = \frac{1}{B-A}\int_A^B (x-\mu)^2\,dx$
        - $h = \frac{B-A}{2}$, $y = x - \mu$로 치환 시,
          $\sigma^2 = \frac{1}{B-A}\int_{-h}^{h} y^2\,dy = \frac{1}{B-A}\left[\frac{y^3}{3}\right]_{-h}^{h} = \frac{1}{B-A} \times \frac{2h^3}{3} = \frac{(B-A)^2}{12}$

연속형 균일분포

- 연속형 균일분포 (3/3)
  - 예제 6.1

어느 회사의 대형 회의실은 4 시간을 초과하여 사용할 수 없다. 그 회의실에서는 긴 회의와 짧은 회의가 자주 열리며, 회의시간 X는 구간 $[0,4]$에서 정의되는 균일분포로 가정할 수 있다고 한다.
(a) 밀도함수를 구하라.
(b) 어떤 회의가 최소한 3 시간 이상 계속될 확률은 얼마인가?

- 풀이
  - (a) 균일분포이므로 밀도 함수는 다음과 같음
    - $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & 0 \le x \le 4 \\ 0, & \text{그 외의 경우} \end{cases}$
  - (b) $P[X \ge 3] = \int_3^4 \frac{1}{4}\, dx = \frac{1}{4}$
    $\therefore 25\%$



<그림 2> 예제 6.1 연속형 균일분포

목 차


- 연속형 균일분포
- 정규분포와 표준정규분포
- 이항분포의 정규근사
- 감마분포와 지수분포
- 카이제곱분포와 베타분포
- 로그정규분포
- 와이블 분포

정규분포와 표준정규분포

- 정규분포 (1/5)
  - 정의
    - 평균값을 중심으로 좌우가 대칭인 종 모양의 연속형 확률분포
      - $n(x;\mu,\sigma)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2},\ -\infty<x<\infty$
        (단, μ는 평균, σ는 표준편차)
  - 필요성
    - 평균을 중심으로 대칭적인 분포를 보이는 연속형 데이터를 모델링하기 위해 사용
      - e.g., 사람의 키, 측정 오차
    - 데이터의 분포 특성을 파악하기 위해 사용
      - e.g.,측정값의 산포와 변동성 분석
    - 특정 구간에 데이터가 포함될 확률을 계산하고 통계적 추론을 수행하기 위해 사용
      - e.g., 특정 범위에 속하는 측정값의 비율 추정

정규분포와 표준정규분포

- 정규분포 (2/5)
  - 특징 (1/4)
    - 가우스 분포(Gaussian Distribution)라고 불림
    - 종 모양의 좌우대칭 곡선 그래프
      - 정규곡선(Normal Curve)
    - 종 모양 확률분포를 가지는 확률변수
      - 정규확률변수(Normal Random Variable)



<그림 3> 정규분포

정규분포와 표준정규분포

- 정규분포 (3/5)
  - 특징 (2/4)
    - 평균 μ, 분산 σ^2, 표준편차 σ
      - $z = \frac{x-\mu}{\sigma}, dx = \sigma dz$로 치환 시,

        $E(X-\mu) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x-\mu}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} z e^{-\frac{1}{2}z^2} dz = 0 = E(X) - \mu$

        $\therefore E(X) = \mu$ (xe^{-x^2} 그래프는 원점 대칭 그래프)
      - $z = \frac{x-\mu}{\sigma}, dx = \sigma dz$로 치환 시,


        $E[(X-\mu)^2] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^2 e^{-\frac{1}{2}\left[\frac{x-\mu}{\sigma}\right]^2} dx = \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} z^2 e^{-\frac{z^2}{2}} dz$
      - $u = z, dv = ze^{-\frac{z^2}{2}} dz$로 부분적분을 하면 $du = dz, v = -e^{-\frac{z^2}{2}}$므로,

        $E[(X-\mu)^2] = \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \left(-ze^{-z^2/2} \Big|_{-\infty}^{\infty} + \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \right) = \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \left(0 + \sqrt{2\pi}\right) = \sigma^2$

        $\therefore E[(X-\mu)^2] = \sigma^2$

정규분포와 표준정규분포


- 정규분포 (4/5)
  - 특징 (3/4)
    - $x = \mu$에서 곡선이 최대값이 되며, 최빈값(Mode)를 가짐
    - 곡선은 평균 μ를 지나는 수직 축에 대하여 대칭
    - 곡선은 $x = \mu \pm \sigma$에서 변곡점 존재
      - $\mu - \sigma < X < \mu + \sigma$에서 아래로 오목, 그 외 구간에서 위로 오목
    - 평균에서 멀어질수록 곡선은 수평축에 접근
    - 곡선과 수평축 사이의 총 면적은 1



<그림 3> 정규분포

정규분포와 표준정규분포


- 정규분포 (5/5)
  - 특징 (4/4)
    - 평균 μ는 정규곡선의 중심위치를 결정
    - 표준편차 σ는 정규곡선의 퍼짐 정도를 결정



<그림 4> 평균과 표준편차에 따른 정규분포

정규분포와 표준정규분포

- 표준정규분포 (1/9)
  - 정의
    - 평균이 0, 분산(또는 표준편차)이 1인 형태의 정규분포
  - 필요성
    - 서로 다른 평균과 표준편차를 가진 정규분포를 표준화하여 동일한 기준으로 비교하기 위해 필요
    - 표준정규분포표를 이용해 확률을 쉽게 계산하고 통계적 분석을 수행하기 위해 사용
  - 특징 (1/2)
    - 종 모양의 곡선이며, 평균인 0을 중심으로 좌우 대칭



<그림 5> 기존의 정규분포와 변환된 표준정규분포

정규분포와 표준정규분포

- 표준정규분포 (2/9)
  - 특징 (2/2)
    - 정규확률변수 X를 $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$로 변환하여 평균이 0, 분산이 1인 표준정규분포로 변환
    - X의 구간 확률을 Z의 구간 확률로 변환하여 표준정규분포를 이용해 계산
    - 정규확률변수 X가 x_1에서 x_2 사이의 값을 가질 경우, 정규확률변수 Z는 z_1에서 z_2 사이의 값을 가짐
      - $P(x_1 < X < x_2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{x_1}^{x_2} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2}\,dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{z_1}^{z_2} e^{-\frac{1}{2}z^2}\,dz$
        $= \int_{z_1}^{z_2} n(z;0,1)\,dz = P(z_1 < Z < z_2)$

정규분포와 표준정규분포

- 표준정규분포 (3/9)
  - 표준정규분포표
    - 정규곡선하에서의 면적을 구하는 데 사용
      - e.g., Z가 0.74보다 작을 확률을 구할 경우, z가 0.74가 되는 값 선택
    - 주어진 확률값 사이에 해당하는 확률값을 계산해야 하는 경우, 표준정규분포표를 통해 두 개의 z 값의 중간값을 사용
      - e.g., 확률 0.7975에 대응하는 z 값은 0.7967과 0.7995 중 0.7975에 더 가까운 $z = 0.83$을 선택
      - e.g., 확률 0.7981은 0.7967과 0.7995의 중앙값이므로 $z = 0.835$를 선택
    - z의 범위는 -3.49~3.49까지 정의
      - $z = 3.49$일 경우, $P(Z > 3.49)$는 0.00024 정도로 작기 때문에 그 외에 범위는 생략

z	.00	.01	.02	.03	.04
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264

<그림 6> 표준정규분포표(부록#1 참고)


정규분포와 표준정규분포

- 표준정규분포 (4/9)
  - 예제 6.2 (1/2)

표준정규분포가 주어졌을 때, 다음의 면적을 구하라.
(a) $z = 1.84$의 오른쪽 면적
(b) $z = -1.97$과 $z = 0.86$ 사이의 면적

- 풀이
  - (a) $z = 1.84$의 오른쪽 면적은 1에서 $z = 1.84$의 왼쪽 면적을 뺀 값

$$\therefore P(Z > 1.84) = 1 - P(Z < 1.84)$$
$$= 1 - 0.9671 = 0.0329\ (= P(Z < -1.84))$$



<그림 7> 예제 6.2 표준정규분포

z	.00	.01	.02	.03	.04
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671

<그림 6> 표준정규분포표(부록#1 참고)


정규분포와 표준정규분포

- 표준정규분포 (5/9)
  - 예제 6.2 (2/2)

표준정규분포가 주어졌을 때, 다음의 면적을 구하라.
(a) $z = 1.84$의 오른쪽 면적
(b) $z = -1.97$과 $z = 0.86$ 사이의 면적

- 풀이
  - (b) $z = -1.97$과 $z = 0.86$ 사이의 면적은 $z = 0.86$의 왼쪽 면적에서 $z = -1.97$의 왼쪽 면적을 뺀 값

$$\therefore P(-1.97 < Z < 0.86) = P(Z < 0.86) - P(Z < -1.97) = 0.8051 - 0.0244 = 0.7807$$



<그림 7> 예제 6.2의 표준정규분포

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07
−3.4	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
−3.3	0.0005	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004
−3.2	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005
−3.1	0.0010	0.0009	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008
−3.0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011
−2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015
−2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021
−2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028
−2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038
−2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051
−2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068
−2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089
−2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116
−2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150
−2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192
−1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244


<그림 6> 표준정규분포표(부록#1 참고)

정규분포와 표준정규분포


- 표준정규분포 (6/9)
  - 예제 6.3

표준정규분포가 주어졌을 때, 다음 각 경우에 대하여 k 값을 구하라.
(a) $P(Z > k) = 0.3015$
(b) $P(k < Z < -0.18) = 0.4197$

- 풀이
  - (a) k 값 오른쪽 면적이 0.3015이므로 왼쪽 면적은 0.6985
    $\therefore k = 0.52 (\because P(Z < k) = 0.6985)$
  - (b) -0.18의 왼쪽 면적은 0.4286이고 k와 -0.18 사이의 면적이 0.4197이므로 k의 왼쪽 면적은 0.0089
    $\therefore k = -2.37 (\because P(Z < k) = 0.0089)$



<그림 8> 예제 6.3 (a) 표준정규분포



<그림 9> 예제 6.3 (b) 표준정규분포

z	.00	.01	.02	.03
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07
−3.4	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
−3.3	0.0005	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004
−3.2	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005
−3.1	0.0010	0.0009	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008
−3.0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011
−2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015
−2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021
−2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028
−2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038
−2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051
−2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068
−2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089
−2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116
−2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150
−2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192

<그림 6> 표준정규분포표


정규분포와 표준정규분포

- 표준정규분포 (7/9)
  - 예제 6.4

$\mu = 50$이고 $\sigma = 10$인 정규분포가 주어졌을 때, X가 45와 62 사이의 값을 취할 확률을 구하라.

- 풀이
  - $x_1 = 45$와 $x_2 = 62$에 대응하는 z 값은 $z_1 = \frac{45-50}{10} = -0.5$,
    $z_2 = \frac{62-50}{10} = 1.2$ 이므로 $P(45 < X < 62) = P(-0.5 < Z < 1.2)$가 됨
  - 위 확률은 표준정규분포의 그래프 $z = 1.2$의 왼쪽 면적에서
    $z = -0.5$의 왼쪽 면적을 뺀 값이 되므로 결과는 다음과 같음
    - $P(45 < X < 62) = P(-0.5 < Z < 1.2) = P(Z < 1.2) - P(Z < -0.5)$
      $= 0.8849 - 0.3085 = 0.5764$

$\therefore X$가 45와 62 사이 값을 취할 확률은 57.64%



<그림 10> 예제 6.4 정규분포

z	.00
0.0	0.5000
0.1	0.5398
0.2	0.5793
0.3	0.6179
0.4	0.6554
0.5	0.6915
0.6	0.7257
0.7	0.7580
0.8	0.7881
0.9	0.8159
1.0	0.8413
1.1	0.8643
1.2	0.8849

z	.00
−3.4	0.0003
−3.3	0.0005
−3.2	0.0007
−3.1	0.0010
−3.0	0.0013
−2.9	0.0019
−2.8	0.0026
−2.7	0.0035
−2.6	0.0047
−2.5	0.0062
−2.4	0.0082
−2.3	0.0107
−2.2	0.0139
−2.1	0.0179
−2.0	0.0228
−1.9	0.0287
−1.8	0.0359
−1.7	0.0446
−1.6	0.0548
−1.5	0.0668
−1.4	0.0808
−1.3	0.0968
−1.2	0.1151
−1.1	0.1357
−1.0	0.1587
−0.9	0.1841
−0.8	0.2119
−0.7	0.2420
−0.6	0.2743
−0.5	0.3085


<그림 6> 표준정규분포표(부록#1 참고)

정규분포와 표준정규분포

- 표준정규분포 (8/9)
  - 예제 6.5

$\mu = 300$이고 $\sigma = 50$인 정규분포가 주어졌을 때, X가 362보다 큰 값을 취할 확률을 구하라.

- 풀이
  - 해당 확률은 $x = 362$를 그에 대응하는 z 값으로 변환한 다음, z 값의 왼쪽 면적을 구하고 1에서 그 값을 빼서 계산 가능
  - $z = \frac{362-300}{50} = 1.24$이므로
  - $P(X > 362) = P(Z > 1.24) = 1 - P(Z < 1.24) = 1 - 0.8925 = 0.1075$
  - $\therefore X$가 362보다 큰 값을 취할 확률은 10.75%



<그림 11> 예제 6.5 정규분포

z	.00	.01	.02	.03	.04
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925


<그림 6> 표준정규분포표

정규분포와 표준정규분포

- 표준정규분포 (9/9)
  - 예제 6.6

$\mu = 40$이고 $\sigma = 6$인 정규분포가 주어졌을 때, 다음을 구하라.
(a) 왼쪽 면적이 전체 면적의 45%가 되는 x
(b) 오른쪽 면적이 전체 면적의 14%가 되는 x

- 풀이
  - (a) 왼쪽 면적이 0.45가 되는 z는 $P(Z < -0.13) = 0.45$이므로 $z = -0.13$
  ∴ 왼쪽 면적이 전체 면적의 45%가 되는 $x = (6)(-0.13) + 40 = 39.22$
  - (b) 오른쪽 면적이 0.14가 되는 z는 $P(Z < 1.08) = 0.86$이므로 $z = 1.08$
  ∴ 오른쪽 면적이 전체 면적의 14%가 되는 $x = (6)(1.08) + 40 = 46.48$



<그림 12> 예제 6.6 정규분포

−0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033
−0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327
−0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643
−0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981
−0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336
−0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707
−0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090
−0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599

<그림 6> 표준정규분포표

정규분포와 표준정규분포


- 정규분포의 적용 (1/8)
  - 예제 6.7

어느 축전지는 평균수명이 3년이고 표준편차가 0.5년인 것으로 알려져 있다. 축전지의 수명이 정규분포를 따른다고 가정할 때, 임의로 주어진 전지의 수명이 2.3년 보다 짧을 확률을 구하라.

- 풀이
  - $P(X < 2.3)$을 구해야하므로 정규곡선하에서 2.3의 왼쪽 면적을 계산
    - 이는 대응하는 z 값이 왼쪽 면적으로 계산

$$z = \frac{2.3-3}{0.5} = -1.4,\ P(X < 2.3) = P(Z < -1.4) = 0.0808$$

∴ 전지의 수명이 2.3년보다 짧을 확률은 8.08%



<그림 13> 예제 6.7 정규분포

z	.00
−3.4	0.0003
−3.3	0.0005
−3.2	0.0007
−3.1	0.0010
−3.0	0.0013
−2.9	0.0019
−2.8	0.0026
−2.7	0.0035
−2.6	0.0047
−2.5	0.0062
−2.4	0.0082
−2.3	0.0107
−2.2	0.0139
−2.1	0.0179
−2.0	0.0228
−1.9	0.0287
−1.8	0.0359
−1.7	0.0446
−1.6	0.0548
−1.5	0.0668
−1.4	0.0808


<그림 6> 표준정규분포표(부록#1 참고)

정규분포와 표준정규분포

- 정규분포의 적용 (2/8)
  - 예제 6.8

어느 전기회사에서는 평균수명이 800 시간이고 표준편차가 40 시간인 정규분포의 수명분포를 가지는 전구를 생산하고 있다. 임의로 선정된 전구의 수명이 778 시간과 834 시간 사이에 있을 확률을 구하라.

- 풀이
  - 전구의 수명 $x_1 = 778, x_2 = 834$에 대응하는 z 값은 각각
    $x_1 = \frac{778-800}{40} = -0.55, x_2 = \frac{834-800}{40} = 0.85$이므로
    $$P(778 < X < 834) = P(-0.55 < Z < 0.85)$$
    $$= P(Z < 0.85) - P(Z < -0.55)$$
    $$= 0.8023 - 0.2912 = 0.5111$$
  - ∴ 전구의 수명이 778 시간과 834 시간 사이에 있을 확률은 51.11%



<그림 14> 예제 6.8 정규분포


정규분포와 표준정규분포

- 정규분포의 적용 (3/8)
  - 예제 6.9

어느 공정에서 볼베어링의 직경이 매우 중요한 품질특성이 된다. 구매자 측은 직경의 규격한계를 3.0 ± 0.01cm로 정해 놓고 이 규격한계를 벗어나는 부품은 불합격처리 한다. 볼베어링의 직경은 평균이 3.0, 표준편차 0.005인 정규분포를 따른다고 할 때, 생산된 제품 중 불합격으로 처리되는 것은 얼마나 되겠는가?

- 풀이
  - 규격 한계인 $x_1 = 2.99, x_2 = 3.01$에 대응되는 z 값은 각각 $z_1 = \frac{2.99-3.0}{0.005} = -2.0, z_2 = \frac{3.01-3.0}{0.005} = 2.0$
  - 따라서 $P(2.99 < X < 3.01) = P(-2.0 < Z < 2.0)$
  - $P(Z < -2.0) = 0.0228$이고 정규분포의 대칭성을 이용하면
    - $P(Z < -2.0) + P(Z > 2.0) = 2 \times 0.0228 = 0.0456$

  $\therefore$ 생산된 볼베어링의 4.56%가 불합격품 처리됨



<그림 15> 예제 6.9 정규분포


정규분포와 표준정규분포

- 정규분포의 적용 (4/8)
  - 예제 6.10

어떤 치수가 규격한계인 $1.50 \pm d$ 내에 들어오지 않으면 모든 부품을 불합격시키는 평가기준이 사용된다고 한다. 측정값은 평균이 1.50이고 표준편차가 0.2인 정규분포를 따른다고 알려져 있을 때, 측정값의 95%가 규격한계 내에 들도록 d 값을 결정하라.

- 풀이
  - $P(Z < -1.96) = 0.025$이므로 $P(-1.96 < Z < 1.96) = 0.95$
  - $1.96 = \frac{(1.50+d)-1.50}{0.2}$이므로 $d = (0.2)(1.96) = 0.392$

∴ 규격 한계를 1.50 ± 0.392로 설정하면 부품의 95%가 규격 한계 내에 존재



<그림 16> 예제 6.10 정규분포


정규분포와 표준정규분포

- 정규분포의 적용 (5/8)
  - 예제 6.11

평균저항이 $40\ \Omega$이고 표준편차가 $2\ \Omega$인 저항기를 만드는 기계가 있다. 저항이 정규분포를 따른다고 가정할 때, $43\ \Omega$이 넘는 저항을 가지게 되는 저항기는 몇 퍼센트나 되겠는가?

- 풀이
  - 저항기의 저항 $x = 43$을 그에 대응하는 z 값으로 변환하면 $z = \frac{43-40}{2} = 1.5$
  - 저항이 $43\ \Omega$ 이상인 경우
    - $P(X > 43) = P(Z > 1.5) = 1 - P(Z < 1.5) = 0.9332 = 0.0668$

  $\therefore 43\ \Omega$ 이상의 저항을 가지게 되는 저항기는 6.68%



<그림 17> 예제 6.11 정규분포


정규분포와 표준정규분포

- 정규분포의 적용 (6/8)
  - 예제 6.12

예제 6.11에서의 저항의 측정값을 소수 첫째 자리에서 반올림할 때 $43\ \Omega$이 넘는 저항기의 비율을 구하라.

- 풀이
  - $42.5\ \Omega$에서 $43.5\ \Omega$ 사이의 저항은 모두 소수 첫째 자리에서 반올림할 경우, $43\ \Omega$가 되므로 $43\ \Omega$을 넘기 위해서는 $43.5\ \Omega$ 보다 커야 함
  - 저항기의 저항 $x = 43.5$를 그에 대응하는 z 값으로 변환하면 $z = \frac{43.5-40}{2} = 1.75$
  - $P(X > 43.5) = P(Z > 1.75) = 1 - P(Z < 1.75) = 1 - 0.9599 = 0.0401$

  $\therefore$ 소수 첫째 자리에서 반올림할 때 $43\ \Omega$이 넘는 저항기는 4.01%
    - 예제 6.11 결과와의 차이인 $6.68\% - 4.01\% = 2.67\%$는 $43\ \Omega$ 보다 크고 $43.5\ \Omega$ 보다 작은 저항을 가지는 저항기의 비율이 됨



<그림 18> 예제 6.12 정규분포


정규분포와 표준정규분포

- 정규분포의 적용 (7/8)
  - 예제 6.13

어느 시험 성적이 평균이 74점이고 표준편차가 7인 정규분포를 따른다고 한다. 12%의 학생에게 A 학점이 주어졌다면, A 학점을 받은 학생 중 가장 낮은 점수와 B 학점을 받은 학생 중 가장 높은 점수는 각각 얼마나 되겠는가?

- 풀이
  - A 학점을 받은 학생의 비율은 성적 평균 $\mu = 74$, 표준편차 $\sigma = 7$일 때 $P(X > k) = 0.12$인 경우
  - 대응하는 z 값을 구하면 $P(Z > 1.18) = 1 - P(Z < 1.18) = 1 - 0.88 = 0.12$를 통해 $z = 0.12$임을 확인 가능
  - $x = \sigma z + \mu$에 대입하여 계산 시, $x = (7)(1.18) + 74 = 82.26$

  ∴ A 학점 중 가장 낮은 점수는 83점, B 학점 중 가장 높은 점수는 82점



<그림 19> 예제 6.13 정규분포


정규분포와 표준정규분포

- 정규분포의 적용 (8/8)
  - 예제 6.14

예제 6.13에서 제 6 십분위수를 구하라.

- 풀이
  - 제 6 십분위수를 D_6라 하면, 구해야 하는 것은 $P(X < k) = 0.6$
  - $P(Z < 0.25) \approx 0.6$이므로 $x = \sigma z + \mu$에 대입 시,
    - $x = (7)(0.25) + 74 = 75.75$

  $\therefore D_6 = 75.75$이며, 이는 성적의 60%가 75점 이하임을 의미



<그림 20> 예제 6.14 정규분포

목 차

- 연속형 균일분포
- 정규분포와 표준정규분포
- 이항분포의 정규근사
- 감마분포와 지수분포
- 카이제곱분포와 베타분포
- 로그정규분포
- 와이블 분포

이항분포의 정규근사

- 이항분포 (1/6)
  - 정의
    - 결과가 두 가지인 이항 분포 독립 시행을 n번 반복할 때 원하는 사건이 일어나는 횟수의 확률분포
      - $b(x;n,p)$, 평균 $\mu = np$, 분산 $\sigma^2 = npq$ (단, $q = 1 - p$)


*독립(Independent)
어떠한 사건이 다른 사건에 영향을 미치지 않는 것.

  - 특징
    - 이항분포에서 n이 매우 크고 p가 0이나 1에 매우 가까운 경우, 포아송 분포를 통해 이항확률의 근사값을 계산
    - 이산형 분포가 종 모양처럼 대칭을 이루는 경우, 정규분포를 통해 근사값을 계산 가능
      - X가 $\mu = np$이고 $\sigma^2 = npq$인 이항확률변수이면, $n \to \infty$일 때 $Z = \frac{X-np}{\sqrt{npq}}$의 극한분포는 표준정규분포 $n(z;0,1)$을 따름


*포아송 분포(Poisson Process)
일정한 평균 발생률을 가지는 사건이 어떤 고정된 구간에서 몇 번 발생하는지를 나타내는 이산형 확률분포.

이항분포의 정규근사

- 이항분포 (2/6)
  - 정규분포 근사
    - 시행 횟수 n이 충분히 크고 p가 0이나 1에 아주 가까운 값이 아닐 경우
      - 통계학에서 충분히 크다는 것은 n이 30 이상일 경우를 의미
    - 시행 횟수 n이 작고 p가 $\frac{1}{2}$에 아주 가까운 값일 경우



<그림 21> n이 크고 p가 0이나 1에 가깝지 않은 경우의 이항분포



<그림 22> p가 $\frac{1}{2}$에 가까운 경우의 이항분포

이항분포의 정규근사


- 이항분포 (3/6)
  - 정규분포 근사 이점
    - 계산 편의성 및 시스템 과부하 방지
      - 시행 횟수(n)가 클 경우, 발생하는 연산에 따른 오버플로우 방지
      - 표준정규분포표와 단순 적분을 활용하여 확률을 빠르고 쉽게 도출
    - 미적분을 활용한 수학적 고도화
      - 불연속적인 데이터를 연속적인 확률밀도함수로 변환
      - 미분을 이용한 최적화 및 적분을 통한 특정 구간의 확률 계산 가능

이항분포의 정규근사

- 이항분포 (4/6)

*모수(Parameter)
모집단(전체 집단)의 특성을 나타내는 수치나 매개변수.

  - 연속성 수정(Continuity Correction)
    - 정규근사 시 오차를 줄이기 위해 x 대신 $x \pm 0.5$를 사용
      - x 이하일 확률과 x 초과일 확률은 $x + 0.5$로 계산
      - x 이상일 확률과 x 미만일 확률은 $x - 0.5$로 계산
    - 모수 n과 확률 p를 갖는 이항확률변수 X는 평균 $\mu = np$이고 분산 $\sigma^2 = npq = np(1-p)$인 정규분포에 근사
    - $P(X \leq x) = \sum_{k=0}^{x} b(k; n, p)$
      $\approx P\left(Z \leq \frac{x+0.5-np}{\sqrt{npq}}\right)$로 계산 가능
      - 해당 정규근사는 np와 $n(1-p)$가 5 이상일 때 더 적합



<그림 23> 이항분포 $b(x; 15, 0.4)$에 대한 $P(7 < X < 9)$의 정규근사


이항분포의 정규근사

- 이항분포 (5/6)
  - 예제 6.15

빈혈환자가 회복될 확률을 0.4라고 한다. 100명의 빈혈환자 중에서 회복되는 환자의 수가 30보다 적을 확률은 얼마인가?

- 풀이
  - 이항확률변수 X가 회복될 환자의 수일 때, $n = 100$이므로
    $\mu = np = (100)(0.4) = 40, \sigma = \sqrt{npq} = \sqrt{(100)(0.4)(0.6)} = 4.899$인 정규분포에 근사
  - 연속성 수정으로 $x = 29.5$ 왼쪽 면적을 계산
    - 대응하는 z 값은 $z = \frac{29.5-40}{4.899} = -2.14$이므로 $P(X < 30) \approx P(Z < -2.14) = 0.0162$

∴ 100명의 빈혈환자 중 회복되는 환자의 수가 30보다 적을 확률은 1.62%



<그림 24> 예제 6.15 표준정규분포


이항분포의 정규근사

- 이항분포 (6/6)
  - 예제 6.16

4개의 보기 중 하나의 정답이 있는 4지선다형 문제 200개가 있다고 하자. 그 시험 문제에 관해서 아무런 지식을 가지고 있지 않은 학생이 200 문제 중 80 문제의 답을 순전히 추측으로 골랐을 때 그 중 정답이 25개에서 30개 까지일 확률은 얼마인가?

- 풀이
  - 확률변수 X를 학생이 맞춘 정답의 수라 할 때, $P(25 \le X \le 30) = \sum_{x=25}^{30} b(x; 80, \frac{1}{4})$임
  - $\mu = np = (80)(1/4) = 20, \sigma = \sqrt{npq} = \sqrt{(80)(1/4)(3/4)} = 3.873$인 정규곡선에 근사시키면 $x_1 = 24.5$와 $x_2 = 30.5$ 사이의 면적을 구하면 되며,
    이에 대응하는 $z_1 = \frac{24.5-20}{3.873} = 1.16, z_2 = \frac{30.5-20}{3.873} = 2.71$
  - $P(25 \le X \le 30) = \sum_{x=25}^{30} b(x; 80, \frac{1}{4}) \approx P(1.16 < Z < 2.71)$
    $= P(Z < 2.71) - P(Z < 1.16)$
    $= 0.9966 - 0.8770 = 0.1196$

∴ 4지선다 80 문제를 추측만으로 풀었을 경우, 정답이 25개에서 30개 사이일 확률은 11.96%



<그림 25> 예제 6.16 확률밀도함수도

목 차

- 연속형 균일분포
- 정규분포와 표준정규분포
- 이항분포의 정규근사
- 감마분포와 지수분포
- 카이제곱분포와 베타분포
- 로그정규분포
- 와이블 분포

감마분포와 지수분포

- 감마함수 (1/4)
  - 정의
    - 팩토리얼(Factorial)의 정의역을 실수와 복소수 범위까지 확장한 특수 함수
      - $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x}\, dx,\ \alpha > 0$
  - 성질
    - 양의 정수 n에 대해 $\Gamma(n) = (n-1)(n-2)\cdots(1)\Gamma(1)$
    - $\Gamma(1) = 1$
    - 양의 정수 n에 대해 $\Gamma(n) = (n-1)!$
    - $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$

감마분포와 지수분포

- 감마함수 (2/4)
  - 증명 (1/3)
    1. $\Gamma(n) = (n-1)(n-2)\cdots(1)\Gamma(1)$ (단, n은 양의 정수)
       - $u = x^{\alpha-1}, dv = e^{-x}\,dx$로 놓고 부분적분 성질 이용
         - $\Gamma(\alpha) = -e^{-x}x^{\alpha-1}|_0^\infty + \int_0^\infty e^{-x}(\alpha-1)x^{\alpha-2}\,dx = 0 + (\alpha-1)\int_0^\infty x^{\alpha-2}e^{-x}\,dx$
       - $\alpha > 1$인 경우, $\Gamma(\alpha) = (\alpha-1)\Gamma(\alpha-1)$
       - 이를 $\Gamma(\alpha) = (\alpha-1)\Gamma(\alpha-1) = (\alpha-1)(\alpha-2)\Gamma(\alpha-2)\cdots$과 같이 반복 적용 시, $\Gamma(\alpha) = (\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(1)\Gamma(1)$
       - $\alpha = n$이고 n이 양의 정수일 경우, $\Gamma(n) = (n-1)(n-2)\cdots(1)\Gamma(1)$
    2. $\Gamma(1) = 1$
       - $\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-x}\,dx = -e^{-x}|_0^\infty = 1$
    3. $\Gamma(n) = (n-1)!$ (단, n은 양의 정수)
       - $\Gamma(n) = (n-1)(n-2)\cdots(1)\Gamma(1)$이고 $\Gamma(1) = 1$이므로 $\Gamma(n) = (n-1)!$

감마분포와 지수분포


- 감마함수 (3/4)
  - 증명 (2/3)
    4. $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$ (1/2)
       - $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^\infty t^{-\frac{1}{2}} e^{-t}\, dt = \int_0^\infty \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}}\, dt$
       - $t = y^2$으로 치환 시(단, $y > 0$), $dt = 2ydy, \sqrt{t} = y$이므로
         $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^\infty \frac{e^{-y^2}}{y} 2ydy = \int_0^\infty 2e^{-y^2}\, dy = 2\int_0^\infty e^{-y^2} dy$
       - 양변 제곱
         - $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)^2 = 4\left(\int_0^\infty e^{-x^2}\, dx\right)\left(\int_0^\infty e^{-y^2}\, dy\right) = 4\int_0^\infty \int_0^\infty e^{-\left(x^2+y^2\right)}\, dx\, dy$
       - $x^2 + y^2 = r^2,\ dxdy = rdrd\theta$로 하여 극좌표 변환
         - $x, y \geq 0$으로 1사분면이므로 $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)^2 = 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^\infty e^{-r^2}\, r\, drd\theta$
       - $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta = \frac{\pi}{2}$이므로 $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)^2 = 4 \times \frac{\pi}{2}\int_0^\infty e^{-r^2}\, rdr = 2\pi\int_0^\infty e^{-r^2}\, rdr$

감마분포와 지수분포

- 감마함수 (4/4)
  - 증명 (3/3)
    4. $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$ (2/2)
       - $u = r^2, du = 2r\,dr$로 하여 치환적분 시,
         $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)^2 = 2\pi \int_0^\infty e^{-r^2}\, r\, dr = 2\pi \times \frac{1}{2} \int_0^\infty e^{-u}\, du = \pi$
       - $\therefore \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \pi$이므로 $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$

감마분포와 지수분포

- 감마분포 (1/2)
  - 정의
    - 특정 사건이 α번째 발생할 때 까지의 대기 시간을 모델링하는 연속형 확률분포
      - $f(x;\alpha,\beta) = \begin{cases} \frac{1}{\beta^{\alpha}\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\frac{x}{\beta}}, & x > 0 \\ 0, & \text{그 외의 경우}(\text{단}, \alpha > 0, \beta > 0) \end{cases}$
        - x는 사건이 일어날 때까지의 시간, α는 사건이 발생하는 횟수, β는 사건 사이의 평균 대기 시간
  - 필요성
    - 특정 횟수의 사건이 발생할 때까지의 대기 시간을 모델링하기 위해 필요
    - 지수분포보다 다양한 형태의 대기 시간과 누적 발생 시간을 표현하기 위해 사용




<그림 26> α, β에 따른 감마분포의 변화

감마분포와 지수분포

- 감마분포 (2/2)
  - 특징
    - α는 분포의 모양을 결정, 형상 모수(Shape Parameter)
    - β는 크기를 결정, 척도 모수(Scale Parameter)
    - 평균 $\mu = \alpha\beta$
      - $\mu = E(X) = \frac{1}{\beta^2\Gamma(\alpha)}\int_0^\infty x^\alpha e^{-\frac{x}{\beta}}\,dx$
      - $y = \frac{x}{\beta}$라 하면,
        - $\mu = \frac{\beta}{\Gamma(\alpha)}\int_0^\infty y^\alpha e^{-y}\,dx = \frac{\beta\Gamma(\alpha+1)}{\Gamma(\alpha)} = \alpha\beta$
    - 분산 $\sigma^2 = \alpha\beta^2$
      - $E(X^2) = \frac{\beta^2\Gamma(\alpha+2)}{\Gamma(\alpha)} = (\alpha+1)\alpha\beta^2$
      - $\sigma^2 = E(X^2) - \mu^2 = (\alpha+1)\alpha\beta^2 - \alpha^2\beta^2 = \alpha\beta^2$
    - 포아송 과정에서 평균 대기시간이 β인 사건이 α번 발생할 때까지의 대기시간에 대한 분포로 해석 가능


*포아송 과정(Poisson Process)
동시에 발생하지 않는 독립된 사건이 일정한 발생률을 가지고 발생하는 확률과정



<그림 26> α, β에 따른 감마분포의 변화

감마분포와 지수분포


- 지수분포 (1/4)
  - 정의
    - 독립적인 사건들이 일정한 평균 속도로 발생할 경우, 어떤 사건이 걸리는 대기 시간을 나타내는 연속형 확률분포
      - $f(x;\beta) = \begin{cases} \frac{1}{\beta} e^{-\frac{x}{\beta}}, & x > 0 \\ 0, & \text{그 외의 경우}(\text{단}, \beta > 0) \end{cases}$
        - x, β는 감마분포와 동일
  - 필요성
    - 사건이 발생할 때까지의 대기 시간을 모델링하기 위해 필요
    - 일정한 발생률을 가진 사건의 대기 시간과 시스템의 수명 등을 분석하기 위해 사용



<그림 27> β에 따른 지수분포의 변화

감마분포와 지수분포

- 지수분포 (2/4)
  - 특징
    - 감마분포에서 $\alpha = 1$일 경우 지수분포라 함
      - 평균 $\mu = \beta$, 분산 $\sigma^2 = \beta^2$을 가짐
    - 포아송 과정에서 평균 대기시간이 β인 사건이 처음 발생할 때까지의 대기시간에 대한 분포로 해석 가능



<그림 27> β에 따른 지수분포의 변화

감마분포와 지수분포

- 지수분포 (3/4)
  - 포아송 과정과의 관계
    - 포아송 과정에서 특정 시간동안 사건이 발생하지 않을 확률로부터 지수분포를 유도 가능
      - 포아송 과정에서 t시간 동안 사건이 발생하지 않을 확률
        - $p(0;\lambda t) = \frac{e^{-\lambda t}(\lambda t)^0}{0!} = e^{-\lambda t}$
      - 첫 번째 포아송 사건이 발생하기까지 소요된 시간을 X라 할 때, $P(X > x)$ 은 x 시간 내 포아송 사건이 한 건도 발생하지 않을 확률과 동일
        - $P(X > x) = e^{-\lambda x}$
      - X의 누적분포함수
        - $P(0 \le X \le x) = 1 - e^{-\lambda x}$
      - 미분 시, $\lambda = \frac{1}{\beta}$인 지수분포의 확률밀도함수
        - $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$

감마분포와 지수분포

- 지수분포 (4/4)
  - 건망성
    - 과거에 흘러간 시간이 미래의 확률에 영향을 주지 않는 성질
    - 예시
      - 지수분포를 따르는 부품이 있다고 할 때, 부품의 수명이 t시간 이상 될 확률 $P(X \geq t)$는 다음의 조건부 확률과 같음
        - $P(X \geq t_0 + t | X \geq t_0) = P(X \geq t)$
        - t_0 시간동안 사건이 발생하지 않은 후, 추가로 t 시간동안 사건이 발생하지 않을 확률이 t 시간동안 사건이 발생하지 않을 확률과 같음
      - 포아송 과정과의 관계를 통해 $P(X > x) = e^{-\lambda x}$이므로, $P(X \geq t_0 + t) = e^{-\lambda(t_0+t)}, P(X \geq t_0) = e^{-\lambda t_0}, P(X \geq t) = e^{-\lambda t}$
      - $P(X \geq t_0 + t | X \geq t_0) = \frac{P(X \geq t_0+t)}{P(X \geq t_0)} = \frac{e^{-\lambda(t_0+t)}}{e^{-\lambda t_0}} = \frac{e^{-\lambda t_0} \times e^{-\lambda t}}{e^{-\lambda t_0}} = e^{-\lambda t}$

      $\therefore P(X \geq t_0 + t | X \geq t_0) = P(X \geq t) = e^{-\lambda t}$
      - 이미 t_0 시간동안 사건이 발생하지 않았더라도 다음 사건까지의 대기 시간 t가 영향을 받지 않음을 의미

감마분포와 지수분포

- 감마분포와 지수분포의 적용 (1/5)
  - 예제 6.17

어떤 부품이 고장나기까지의 시간(단위: 년)을 나타내는 확률변수를 T라고 하자. 그리고 T는 고장나기까지의 평균시간이 $\beta = 5$인 지수분포를 따른다고 하자. 이 부품 5개가 각각 다른 시스템에 설치되었다고 할 때, 8년이 지난 후 적어도 2개의 부품이 여전히 작동하고 있을 확률은 얼마인가?

- 풀이
  - 하나의 부품이 8년 이상 작동할 확률은 $P(T > 8) = \frac{1}{5}\int_8^\infty e^{-\frac{t}{5}}\,dt = e^{-\frac{8}{5}} \approx 0.2$
  - 확률변수 X가 8년이 지난 후 작동하고 있을 부품의 수라 할 때,
    - 이는 $n = 5, p \approx 0.2$인 이항분포 $b(x; 5,0.2)$로 볼 수 있으므로,

$$P(X \geq 2) = \sum_{x=2}^{5} b(x; 5,0.2) = 1 - \sum_{x=0}^{1} b(x; 5,0.2)$$
$$= 1 - 0.7373 = 0.2627$$

∴ 8년 후에도 적어도 2개 이상의 부품이 작동 중일 확률은 26.27%

감마분포와 지수분포

- 감마분포와 지수분포의 적용 (2/5)
  - 예제 6.18

전화교환기에 도착되는 호출신호는 분당 평균이 5회인 포아송 과정을 따른다고 한다. 1분 내에 2번 이상의 호출신호가 도착될 확률을 구하라.

- 풀이
  - 확률변수 X를 2번의 호출신호가 도착되기까지 소요된 시간이라 할 때,
    - 이는 2번의 포아송 사건이 발생되기까지 소요된 시간으로 $\alpha = 2, \beta = \frac{1}{5}$인 감마분포를 따르는 확률변수
    - $P(X \leq 1) = \int_0^1 \frac{1}{\beta^2} x e^{-x/\beta}\, dx = 25 \int_0^1 x e^{-5x}\, dx$

$$= 1 - e^{-5}(1 + 5) = 0.96$$

∴ 1분 내에 2번 이상 호출신호를 받을 확률은 96%

감마분포와 지수분포

- 감마분포와 지수분포의 적용 (3/5)
  - 예제 6.19

쥐를 이용한 생의학 실험에서는 독극물이 생존시간에 미치는 영향을 살펴보기 위해 용량반응(Dose-response) 검사를 이용한다. 연구에 의하면 일정량의 독극물에 대한 생존시간(단위: 주)은 $\alpha = 5$이고 $\beta = 10$인 감마분포를 따른다고 한다. 어떤 쥐에 독극물을 주입했을 때 60주 이상 생존하지 못할 확률은 얼마인가?

- 풀이
  - 확률변수 X를 생존시간이라 하면, $P(X \leq 60) = \frac{1}{\beta^5}\int_0^{60} \frac{x^{\alpha-1}e^{-\frac{x}{\beta}}}{\Gamma(5)}\,dx$
  - 해당 적분은 불완전 감마함수 $F(x;\alpha) = \int_0^x \frac{y^{\alpha-1}e^{-y}}{\Gamma(\alpha)}\,dy$를 이용하여 계산 가능
  - 구하고자 하는 확률식에서 $y = \frac{x}{\beta}$, $x = \beta y$로 놓으면 $P(X \leq 60) = \int_0^6 \frac{y^4 e^{-y}}{\Gamma(5)}\,dy$이며, 이는 불완전 감마함수표의 $F(6;5)$ 값임
  - $P(X \leq 60) = F(6;5) = 0.715$

∴ 쥐에게 독극물을 주입했을 때 60주 이상 생존하지 못할 확률은 71.5%

x	1	2	3	4	5
1	0.6320	0.2640	0.0800	0.0190	0.0040
2	0.8650	0.5940	0.3230	0.1430	0.0530
3	0.9500	0.8010	0.5770	0.3530	0.1850
4	0.9820	0.9080	0.7620	0.5670	0.3710
5	0.9930	0.9600	0.8750	0.7350	0.5600
6	0.9980	0.9830	0.9380	0.8490	0.7150

<그림 28> 감마함수표

감마분포와 지수분포

- 감마분포와 지수분포의 적용 (4/5)
  - 예제 6.20

과거자료로부터 어느 제품에 대한 고객의 불만제기 사이의 시간간격(단위: 개월)은 $\alpha = 2$이고 $\beta = 4$인 감마분포를 따른다고 알려져 있다. 최근 품질관리를 철저히 실시하고 난 후 첫 번째 불만이 발생할 때까지 20개월이 소요되었다. 이것으로부터 품질관리를 철저히 실시한 것이 효과적이었다고 할 수 있는가?

- 풀이
  - 확률변수 X를 품질관리 전 첫 번째 불만제기까지의 시간이라 할 때,

$$P(X \geq 20) = 1 - \frac{1}{\beta^{\alpha}} \int_0^{20} \frac{x^{\alpha-1} e^{-\frac{x}{\beta}}}{\Gamma(\alpha)} \, dx$$

  - $y = \frac{x}{\beta}, x = \beta y$로 놓으면 $F(5;2) = 0.96$이므로

$$P(X \geq 20) = 1 - \int_0^5 \frac{y e^{-y}}{\Gamma(2)} \, dy = 1 - F(5;2) = 1 - 0.96 = 0.04$$

$\therefore$ 자주 발생했다고 보기 어려우며, 따라서 품질관리가 효과적이었다고 판단

x	1	2	3
1	0.6320	0.2640	0.0800
2	0.8650	0.5940	0.3230
3	0.9500	0.8010	0.5770
4	0.9820	0.9080	0.7620
5	0.9930	0.9600	0.8750

<그림 28> 감마함수표

감마분포와 지수분포

- 감마분포와 지수분포의 적용 (5/5)
  - 예제 6.21

어느 세탁기가 고장날 때까지의 시간 Y는 다음의 밀도함수를 따른다.

$$f(y) = \begin{cases} \frac{1}{4} e^{-\frac{y}{4}}, & y \geq 0 \\ 0, & \text{그 외의 경우} \end{cases}$$

이것은 $\mu = 4$년인 지수분포이다. 이 세탁기가 6년 이상 고장나지 않을 확률은 얼마인가? 또한 1년 이내에 고장날 확률은 얼마인가?

- 풀이
  - 지수분포의 누적분포함수 $F(y) = \frac{1}{\beta}\int_0^y e^{-\frac{t}{\beta}}\,dt = 1 - e^{-\frac{y}{\beta}}$
  - $P(Y > 6) = 1 - F(6) = e^{-\frac{3}{2}} = 0.2231$

  $\therefore$ 6년 이상 고장나지 않을 확률 22.31%
  - $P(Y < 1) = 1 - e^{-\frac{1}{4}} = 1 - 0.7788 = 0.2212$

  $\therefore$ 1년 이내에 고장날 확률 22.12%

목 차


- 연속형 균일분포
- 정규분포와 표준정규분포
- 이항분포의 정규근사
- 감마분포와 지수분포
- 카이제곱분포와 베타분포
- 로그정규분포
- 와이블 분포

카이제곱분포와 베타분포

- 카이제곱분포 (1/2)
  - 정의
    - 서로 독립인 표준정규분포 확률변수들을 각각 제곱한 뒤 모두 더한 값들이 따르는 연속형 확률분포
      - $f(x;v) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\frac{v}{2}}\Gamma(\frac{v}{2})} x^{\frac{v}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}, & x > 0 \\ 0, & \text{그 외의 경우(단, } v\text{는 양의 정수)} \end{cases}$
        - x는 카이제곱 확률변수가 가질 수 있는 값, v는 자유도

*자유도(Degrees of Freedom)
통계량을 구성하는 표준정규변수 중 임의로 값을 가질 수 있는 독립 변수의 개수.

  - 필요성
    - 관측값과 기대값의 차이를 바탕으로 데이터의 적합성을 검정하기 위해 필요
    - 모집단의 분산에 대한 추론과 통계적 가설검정을 수행하기 위해 사용




<그림 29> 자유도에 따른 카이제곱분포의 변화

카이제곱분포와 베타분포

- 카이제곱분포 (2/2)
  - 특징
    - 서로 독립인 표준정규분포 확률변수들의 제곱합으로 정의
    - 평균 $\mu = v$, 분산 $\sigma^2 = 2v$를 가짐
    - 감마분포에서 $\alpha = \frac{v}{2}, \beta = 2$인 특수한 경우
    - 모분산 추청, 독립성 검정 등 다양한 통계적 검정에서 활용
      - 표본분산을 이용해 모분산을 추정하거나, 관측도수와 기대도수의 차이를 이용해 적합도 및 독립성 검정을 수행
    - 자유도에 따라 그래프 모양 변화
      - 작을 수록 왼쪽으로,
        클 수록 오른쪽으로 치우침

*자유도(Degrees of Freedom)
통계량을 구성하는 표준정규변수 중 임의로 값을 가질 수 있는 독립 변수의 개수.




<그림 29> 자유도에 따른 카이제곱분포의 변화

카이제곱분포와 베타분포

- 베타함수
  - 정의
    - 모수 $\alpha, \beta > 0$와 감마함수 $\Gamma(\alpha)$에 대해 다음을 만족하는 함수
      - $B(\alpha, \beta) = \int_0^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}\,dx = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}$
    - 증명
      - $\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta) = \left(\int_0^\infty x^{\alpha-1}e^{-x}\,dx\right)\left(\int_0^\infty y^{\beta-1}e^{-y}\,dy\right)$
        $= \int_0^\infty \int_0^\infty x^{\alpha-1}y^{\beta-1}e^{-(x+y)}\,dx\,dy$
      - $t = x + y, s = \frac{x}{x+y}$로 하면 $x = st, y = (1-s)t, dx\,dy = t\,ds\,dt$이므로,
        $x^{\alpha-1}y^{\beta-1}e^{-(x+y)} = (st)^{\alpha-1}\big((1-s)t\big)^{\beta-1}e^{-t}$
        $= s^{\alpha-1}t^{\alpha-1}(1-s)^{\beta-1}t^{\beta-1}e^{-t} = s^{\alpha-1}(1-s)^{\beta-1}t^{\alpha+\beta-2}e^{-t}$
      - $\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta) = \int_0^\infty \int_0^1 s^{\alpha-1}(1-s)^{\beta-1}t^{\alpha+\beta-1}e^{-t}\,ds\,dt$
        $= \left(\int_0^\infty t^{\alpha+\beta-1}e^{-t}\,dt\right)\left(\int_0^1 s^{\alpha-1}(1-s)^{\beta-1}\,ds\right) = \Gamma(\alpha+\beta)B(\alpha,\beta)$
      - $\therefore B(\alpha, \beta) = \Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)/\Gamma(\alpha+\beta)$

카이제곱분포와 베타분포


- 베타분포 (1/2)
  - 정의
    - 0과 1 사이의 값을 갖는 연속형 확률분포
      - $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{B(\alpha,\beta)} x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{그 외의 경우} (\text{단}, \alpha > 0, \beta > 0) \end{cases}$
        - x는 확률변수 X가 가질 수 있는 값, α는 성공 횟수/발생 횟수 등 긍정적/관심 있는 사건의 누적 데이터, β는 실패 횟수/미발생 횟수 등 부정적/관심 없는 사건의 누적 데이터
  - 필요성
    - 0과 1 사이의 확률이나 비율을 모델링하기 위해 필요
    - 모양을 다양하게 조절할 수 있어 성공 확률이나 비율의 불확실성을 표현하기 위해 사용



<그림 30> α, β에 따른 베타분포의 변화

카이제곱분포와 베타분포

- 베타분포 (2/2)
  - 특징
    - 균일분포를 일반화 한 분포
    - 평균 $\mu = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}$, 분산 $\sigma^2 = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$을 가짐
    - $\alpha = 1, \beta = 1$인 경우, [0,1] 구간에서 균일분포가 됨
    - 정의역이 0~1로, 확률/비율에 대한 분포를 다룰 때 주로 사용



<그림 30> α, β에 따른 베타분포의 변화

목 차


- 연속형 균일분포
- 정규분포와 표준정규분포
- 이항분포의 정규근사
- 감마분포와 지수분포
- 카이제곱분포와 베타분포
- 로그정규분포
- 와이블 분포

로그정규분포

- 로그정규분포 (1/4)
  - 정의
    - 확률변수에 자연로그를 취한 값이 정규분포를 따르는 연속형 확률분포
      - $f(x;\mu,\sigma) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma x} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}[\ln(x)-\mu]^2}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$
        - x는 확률변수 X가 가질 수 있는 값, α는 자연로그를 취했을 때 정규분포의 평균, β는 자연로그를 취했을 때 정규분포의 표준편차
  - 필요성
    - 로그를 취했을 때 정규분포를 따르는 양의 연속형 데이터를 모델링하기 위해 필요
    - 값이 0보다 크고 오른쪽으로 긴 꼬리를 가지는 소득, 수명, 자산 규모 등의 데이터를 분석하기 위해 사용

로그정규분포

- 로그정규분포 (2/4)
  - 특징
    - 평균$\mu = e^{\mu+\frac{\sigma^2}{2}}$, 분산$\sigma^2 = e^{2\mu+\sigma^2}(e^{\sigma^2} - 1)$을 가짐
    - 오른쪽에 긴 꼬리가 생기는 비대칭 그래프
    - 양의 값만 가질 수 있음
    - 곱셈에 의해 누적되는 현상 표현 시 적합
      - e.g., 취약점, 공격 노출도, 공격 영향도 등이 결합된 위험도
    - 실제 데이터에서 큰 값이 드물게 나타나는 현상 표현에 활용
      - e.g., 대규모 네트워크 트래픽, 공격 규모, 피해 규모



<그림 31> $\ln(X)$의 μ, σ에 따른 로그정규분포의 변화


로그정규분포

- 로그정규분포 (3/4)
  - 예제 6.22

화학공장에서 배출되는 오염물질의 농도(ppm)가 $\mu = 3.2$이고 $\sigma = 1$인 로그정규분포를 따른다고 하자. 농도가 8ppm을 초과할 확률은 얼마인가?

- 풀이
  - 확률변수 X를 오염물질의 농도라 하면, $P(X > 8) = 1 - P(X \leq 8)$
  - $\ln(X)$는 평균 $\mu = 3.2$이고 표준편차 $\sigma = 1$인 정규분포를 따르므로
  - $P(X \leq 8) = \Phi\left[\frac{\ln(8)-3.2}{1}\right] = \Phi(-1.12) = 0.1314$ (단, Φ는 표준정규분포의 누적분포함수)
  - $P(X > 8) = 1 - P(X \leq 8) = 1 - 0.1314 = 0.8686$

  ∴ 오염물질 농도가 8ppm을 초과할 확률은 86.86%



<그림 32> 예제 6.22 로그정규분포


로그정규분포

- 로그정규분포 (4/4)
  - 예제 6.23

기관차에 사용되는 어떤 전자제어장치의 수명(단위: 1000마일)은 $\mu = 5.149$이고 $\sigma = 0.737$인 로그정규분포를 따른다고 한다. 수명의 5 백분위수를 구하라.

- 풀이
  - 확률변수 X를 장치의 수명이라 하면, $P(Z < -1.645) = 0.0500$이고 $\ln(x)$는 평균 $\mu = 5.149$, 표준편차 $\sigma = 0.737$인 정규분포를 따르므로
    - $\ln(x) = 5.149 + (0.737)(-1.645) = 3.937$

$\therefore x = 51.265$이며, 이는 장치의 5%만이 51,265 마일 이하의 수명을 가짐을 의미




<그림 33> 예제 6.23 로그정규분포

목 차

- 연속형 균일분포
- 정규분포와 표준정규분포
- 이항분포의 정규근사
- 감마분포와 지수분포
- 카이제곱분포와 베타분포
- 로그정규분포
- 와이블 분포

와이블 분포


- 와이블 분포 (1/5)
  - 정의
    - 제품의 수명, 고장 시간, 강도 등을 모델링하는 데 널리 쓰이는 연속형 확률분포
      - $f(x;\alpha,\beta) = \begin{cases} \alpha\beta x^{\beta-1}e^{-\alpha x^{\beta}}, & x > 0 \\ 0, & \text{그 외의 경우} \end{cases}$ (단, $\alpha > 0, \beta > 0$)
        - x는 기계나 부품의 수명 및 고장까지 걸리는 시간, α는 고장률의 시간적 변화 패턴, β는 특성 수명
  - 필요성
    - 제품이나 부품의 고장 시간과 수명을 모델링하기 위해 필요
    - 시간에 따라 고장률이 증가하거나 감소하는 다양한 수명 특성을 분석하기 위해 사용



<그림 34> $\alpha = 1$일 때 β에 따른 와이블분포 변화

와이블 분포

- 와이블 분포 (2/5)
  - 특징
    - 평균 $\mu = \alpha^{-\frac{1}{\beta}}\Gamma\left(1+\frac{1}{\beta}\right)$, 분산 $\sigma^2 = \alpha^{-\frac{2}{\beta}}\left\{\Gamma\left(1+\frac{2}{\beta}\right) - \left[\Gamma\left(1+\frac{1}{\beta}\right)\right]^2\right\}$을 가짐
    - $\beta = 1$일 때 지수분포의 형태를 띔
    - 누적분포함수 $F(x) = 1 - e^{-\alpha x^{\beta}}$(단, $x \geq 0, \alpha > 0, \beta > 0$)
    - 시간에 따른 고장률 분포를 나타내기 위해 주로 사용




<그림 34> $\alpha = 1$일 때 β에 따른 와이블 분포 변화

와이블 분포

- 와이블 분포 (3/5)
  - 고장률(Failure Rate 또는 Hazard Rate) (1/2)
    - 어느 부품의 신뢰도 $R(t)$를 최소한 어느 특정시간 t까지 부품이 작동할 확률로 정의하면 다음과 같음
      - $R(t) = P(T > t) = \int_t^{\infty} f(t)\,dt = 1 - F(t)$
    - $F(t)$가 T의 누적분포이므로 부품이 t 시간 작동했을 때, 구간 $T = t$와 $T = t + \Delta t$ 사이에 고장날 조건부확률은 다음과 같음
      - $\frac{F(t+\Delta t)-F(t)}{R(t)}$
    - 이를 Δt로 나누고 $\Delta t \to 0$으로 극한을 취하면 고장률 $Z(t)$를 다음과 같이 얻을 수 있음
      - $Z(t) = \lim_{t\to 0} \frac{F(t+\Delta t)-F(t)}{\Delta t} \frac{1}{R(t)} = \frac{F'(t)}{R(t)} = \frac{f(t)}{R(t)} = \frac{f(t)}{1-F(t)}$
        $= \frac{\alpha\beta t^{\beta-1} e^{-\alpha t^{\beta}}}{1-1+e^{-\alpha t^{\beta}}} = \alpha\beta t^{\beta-1}$

와이블 분포

- 와이블 분포 (4/5)
  - 고장률(Failure Rate 또는 Hazard Rate) (2/2)
    - 고장률 $Z(t) = \alpha\beta t^{\beta-1}$는 부품이 t 시간동안 고장나지 않았을 때, t부터 Δt만큼 더 생존할 조건부확률의 변화율을 의미
    - $\beta = 1$이면 고장률은 α로서 상수가 되고, 지수분포의 형태를 띄며 건망성 특성을 가짐
    - $\beta > 1$이면 $Z(t)$는 증가함수로, 부품이 시간에 따라 마모되는 현상을 표현
    - $\beta < 1$이면 $Z(t)$는 감소함수로, 시간이 지남에 따라 오히려 강해짐을 의미




<그림 35> β에 따른 고장률 변화

와이블 분포

- 와이블 분포 (5/5)
  - 예제 6.24

어느 제품의 수명(단위: 시간)은 $\alpha = 0.01$이고 $\beta = 2$인 와이블분포를 따른다고 한다. 8시간 이전에 이 제품이 고장날 확률은 얼마인가?

- 풀이
  - $P(X < 8) = F(8) = 1 - e^{-(0.01)8^2} = 1 - 0.5273 = 0.4727$



<그림 36> 예제 6.24 와이블 분포

Thanks!

서 진 우(jinwoo@pel.sejong.ac.kr)

부록#1

- 표준정규분포표 (1/2)

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
−3.4	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0002
−3.3	0.0005	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0003
−3.2	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005
−3.1	0.0010	0.0009	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007
−3.0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010
−2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
−2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
−2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
−2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
−2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
−2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064
−2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
−2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
−2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
−2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
−1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
−1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
−1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
−1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
−1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
−1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681
−1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
−1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
−1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
−1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
−0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
−0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
−0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
−0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
−0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
−0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
−0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
−0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
−0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
−0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641

부록#1

- 표준정규분포표 (2/2)

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

부록#2

- 불완전 감마함수표

	α									
x	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	0.6320	0.2640	0.0800	0.0190	0.0040	0.0010	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	0.8650	0.5940	0.3230	0.1430	0.0530	0.0170	0.0050	0.0010	0.0000	0.0000
3	0.9500	0.8010	0.5770	0.3530	0.1850	0.0840	0.0340	0.0120	0.0040	0.0010
4	0.9820	0.9080	0.7620	0.5670	0.3710	0.2150	0.1110	0.0510	0.0210	0.0080
5	0.9930	0.9600	0.8750	0.7350	0.5600	0.3840	0.2380	0.1330	0.0680	0.0320
6	0.9980	0.9830	0.9380	0.8490	0.7150	0.5540	0.3940	0.2560	0.1530	0.0840
7	0.9990	0.9930	0.9700	0.9180	0.8270	0.6990	0.5500	0.4010	0.2710	0.1700
8	1.0000	0.9970	0.9860	0.9580	0.9000	0.8090	0.6870	0.5470	0.4070	0.2830
9		0.9990	0.9940	0.9790	0.9450	0.8840	0.7930	0.6760	0.5440	0.4130
10		1.0000	0.9970	0.9900	0.9710	0.9330	0.8700	0.7800	0.6670	0.5420
11			0.9990	0.9950	0.9850	0.9620	0.9210	0.8570	0.7680	0.6590
12			1.0000	0.9980	0.9920	0.9800	0.9540	0.9110	0.8450	0.7580
13				0.9990	0.9960	0.9890	0.9740	0.9460	0.9000	0.8340
14				1.0000	0.9980	0.9940	0.9860	0.9680	0.9380	0.8910
15					0.9990	0.9970	0.9920	0.9820	0.9630	0.9300

부록#3

- 카이제곱분포표 (1/2)

	α									
v	**0.995**	**0.99**	**0.98**	**0.975**	**0.95**	**0.90**	**0.80**	**0.75**	**0.70**	**0.50**
1	0.0^4393	0.0^3157	0.0^3628	0.0^3982	0.00393	0.0158	0.0642	0.102	0.148	0.455
2	0.0100	0.0201	0.0404	0.0506	0.103	0.211	0.446	0.575	0.713	1.386
3	0.0717	0.115	0.185	0.216	0.352	0.584	1.005	1.213	1.424	2.366
4	0.207	0.297	0.429	0.484	0.711	1.064	1.649	1.923	2.195	3.357
5	0.412	0.554	0.752	0.831	1.145	1.610	2.343	2.675	3.000	4.351
6	0.676	0.872	1.134	1.237	1.635	2.204	3.070	3.455	3.828	5.348
7	0.989	1.239	1.564	1.690	2.167	2.833	3.822	4.255	4.671	6.346
8	1.344	1.647	2.032	2.180	2.733	3.490	4.594	5.071	5.527	7.344
9	1.735	2.088	2.532	2.700	3.325	4.168	5.380	5.899	6.393	8.343
10	2.156	2.558	3.059	3.247	3.940	4.865	6.179	6.737	7.267	9.342
11	2.603	3.053	3.609	3.816	4.575	5.578	6.989	7.584	8.148	10.341
12	3.074	3.571	4.178	4.404	5.226	6.304	7.807	8.438	9.034	11.340
13	3.565	4.107	4.765	5.009	5.892	7.041	8.634	9.299	9.926	12.340
14	4.075	4.660	5.368	5.629	6.571	7.790	9.467	10.165	10.821	13.339
15	4.601	5.229	5.985	6.262	7.261	8.547	10.307	11.037	11.721	14.339
16	5.142	5.812	6.614	6.908	7.962	9.312	11.152	11.912	12.624	15.338
17	5.697	6.408	7.255	7.564	8.672	10.085	12.002	12.792	13.531	16.338
18	6.265	7.015	7.906	8.231	9.390	10.865	12.857	13.675	14.440	17.338
19	6.844	7.633	8.567	8.907	10.117	11.651	13.716	14.562	15.352	18.338
20	7.434	8.260	9.237	9.591	10.851	12.443	14.578	15.452	16.266	19.337
21	8.034	8.897	9.915	10.283	11.591	13.240	15.445	16.344	17.182	20.337
22	8.643	9.542	10.600	10.982	12.338	14.041	16.314	17.240	18.101	21.337
23	9.260	10.196	11.293	11.689	13.091	14.848	17.187	18.137	19.021	22.337
24	9.886	10.856	11.992	12.401	13.848	15.659	18.062	19.037	19.943	23.337
25	10.520	11.524	12.697	13.120	14.611	16.473	18.940	19.939	20.867	24.337
26	11.160	12.198	13.409	13.844	15.379	17.292	19.820	20.843	21.792	25.336
27	11.808	12.878	14.125	14.573	16.151	18.114	20.703	21.749	22.719	26.336
28	12.461	13.565	14.847	15.308	16.928	18.939	21.588	22.657	23.647	27.336
29	13.121	14.256	15.574	16.047	17.708	19.768	22.475	23.567	24.577	28.336
30	13.787	14.953	16.306	16.791	18.493	20.599	23.364	24.478	25.508	29.336
40	20.707	22.164	23.838	24.433	26.509	29.051	32.345	33.66	34.872	39.335
50	27.991	29.707	31.664	32.357	34.764	37.689	41.449	42.942	44.313	49.335
60	35.534	37.485	39.699	40.482	43.188	46.459	50.641	52.294	53.809	59.335

부록#3

- 카이제곱분포표 (2/2)

	α									
v	**0.30**	**0.25**	**0.20**	**0.10**	**0.05**	**0.025**	**0.02**	**0.01**	**0.005**	**0.001**
1	1.074	1.323	1.642	2.706	3.841	5.024	5.412	6.635	7.879	10.827
2	2.408	2.773	3.219	4.605	5.991	7.378	7.824	9.210	10.597	13.815
3	3.665	4.108	4.642	6.251	7.815	9.348	9.837	11.345	12.838	16.266
4	4.878	5.385	5.989	7.779	9.488	11.143	11.668	13.277	14.860	18.466
5	6.064	6.626	7.289	9.236	11.070	12.832	13.388	15.086	16.750	20.515
6	7.231	7.841	8.558	10.645	12.592	14.449	15.033	16.812	18.548	22.457
7	8.383	9.037	9.803	12.017	14.067	16.013	16.622	18.475	20.278	24.321
8	9.524	10.219	11.030	13.362	15.507	17.535	18.168	20.090	21.955	26.124
9	10.656	11.389	12.242	14.684	16.919	19.023	19.679	21.666	23.589	27.877
10	11.781	12.549	13.442	15.987	18.307	20.483	21.161	23.209	25.188	29.588
11	12.899	13.701	14.631	17.275	19.675	21.920	22.618	24.725	26.757	31.264
12	14.011	14.845	15.812	18.549	21.026	23.337	24.054	26.217	28.300	32.909
13	15.119	15.984	16.985	19.812	22.362	24.736	25.471	27.688	29.819	34.527
14	16.222	17.117	18.151	21.064	23.685	26.119	26.873	29.141	31.319	36.124
15	17.322	18.245	19.311	22.307	24.996	27.488	28.259	30.578	32.801	37.698
16	18.418	19.369	20.465	23.542	26.296	28.845	29.633	32.000	34.267	39.252
17	19.511	20.489	21.615	24.769	27.587	30.191	30.995	33.409	35.718	40.791
18	20.601	21.605	22.760	25.989	28.869	31.526	32.346	34.805	37.156	42.312
19	21.689	22.718	23.900	27.204	30.144	32.852	33.687	36.191	38.582	43.819
20	22.775	23.828	25.038	28.412	31.410	34.170	35.020	37.566	39.997	45.314
21	23.858	24.935	26.171	29.615	32.671	35.479	36.343	38.932	41.401	46.796
22	24.939	26.039	27.301	30.813	33.924	36.781	37.659	40.289	42.796	48.268
23	26.018	27.141	28.429	32.007	35.172	38.076	38.968	41.638	44.181	49.728
24	27.096	28.241	29.553	33.196	36.415	39.364	40.270	42.980	45.558	51.179
25	28.172	29.339	30.675	34.382	37.652	40.646	41.566	44.314	46.928	52.619
26	29.246	30.435	31.795	35.563	38.885	41.923	42.856	45.642	48.290	54.051
27	30.319	31.528	32.912	36.741	40.113	43.195	44.140	46.963	49.645	55.475
28	31.391	32.620	34.027	37.916	41.337	44.461	45.419	48.278	50.994	56.892
29	32.461	33.711	35.139	39.087	42.557	45.722	46.693	49.588	52.335	58.301
30	33.530	34.800	36.250	40.256	43.773	46.979	47.962	50.892	53.672	59.702
40	44.165	45.616	47.269	51.805	55.758	59.342	60.436	63.691	66.766	73.403
50	54.723	56.334	58.164	63.167	67.505	71.420	72.613	76.154	79.490	86.660
60	65.226	66.981	68.972	74.397	79.082	83.298	84.58	88.379	91.952	99.608

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 1> 연속형 균일분포

```
1.  import numpy as np
2.  import matplotlib.pyplot as plt
3.
4.  # 구간 설정
5.  x = np.linspace(1, 3, 400)
6.  y = np.full_like(x, 0.5)
7.
8.  plt.figure(figsize=(6, 3))
9.
10. # 밀도함수 (실선)
11. plt.plot(x, y, color="deepskyblue", linewidth=2)
12.
13. # 점선 (x=1, x=3)
14. plt.vlines([1, 3], ymin=0, ymax=0.5,
15.             colors="deepskyblue",
    linestyles="dashed")
16.
17. # y = 1/2 점선
18. plt.hlines(0.5, xmin=0, xmax=1,
19.             colors="black", linestyles="dashed")
```

```
20. # 축 설정
21. plt.xlim(0, 3.5)
22. plt.ylim(0, 0.7)
23. plt.xlabel("x")
24. plt.ylabel("f(x)")
25. plt.xticks([0, 1, 3])
26. plt.yticks([0.5], ["1/2"])
27.
28. ax = plt.gca()
29. ax.spines["top"].set_visible(False)
30. ax.spines["right"].set_visible(False)
31.
32. plt.tight_layout()
33. plt.show()
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 2> 예제 6.1 연속형 균일분포

```
1.  import numpy as np
2.  import matplotlib.pyplot as plt
3.
4.  # 구간 설정 (0 ≤ x ≤ 4)
5.  x = np.linspace(0, 4, 400)
6.  y = np.full_like(x, 1/4)
7.  plt.figure(figsize=(6, 3))
8.  # 밀도함수
9.  plt.plot(x, y, color="deepskyblue", linewidth=2)
10. # 점선
11. plt.vlines([0, 4], ymin=0, ymax=1/4,
12.            colors="deepskyblue",
    linestyles="dashed")
13. # 확률 영역: X ≥ 3 음영
14. x_shade = np.linspace(3, 4, 200)
15. y_shade = np.full_like(x_shade, 1/4)
16. plt.fill_between(
17.     x_shade, 0, y_shade,
18.     color="pink", alpha=0.6
19. )
```

```
20. # x=3 경계선
21. plt.vlines(3, ymin=0, ymax=1/4,
22.            colors="black", linestyles="dashed")
23. # 축 설정
24. plt.xlim(-0.5, 4.5)
25. plt.ylim(0, 0.35)
26. plt.xlabel("x")
27. plt.ylabel("f(x)")
28.
29. plt.xticks([0, 3, 4])
30. plt.yticks([1/4], ["1/4"])
31.
32. ax = plt.gca()
33. ax.spines["top"].set_visible(False)
34. ax.spines["right"].set_visible(False)
35.
36. plt.tight_layout()
37. plt.show()
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 3> 정규분포

```
1.  import numpy as np
2.  import matplotlib.pyplot as plt
3.  import math
4.
5.  mu = 0   # 정규분포 파라미터
6.  sigma = 1
7.
8.  # x 범위
9.  x = np.linspace(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma, 500)
10. # 정규분포 PDF
11. y = (1 / (math.sqrt(2 * math.pi) * sigma)) *
    np.exp(
12.     -0.5 * ((x - mu) / sigma) ** 2
13. )
14. plt.figure(figsize=(6, 3))
15.
16. # 정규분포 곡선
17. plt.plot(x, y, color="deepskyblue", linewidth=2)
18.
19. # 평균 μ 점선
20. plt.vlines(mu, ymin=0, ymax=max(y),
21.            colors="black", linestyles="dashed")
```

```
22. plt.annotate(   # σ 표시
23.     "",
24.     xy=(mu + sigma, max(y) * 0.6),
25.     xytext=(mu, max(y) * 0.6),
26.     arrowprops=dict(arrowstyle="<->")
27. )
28.
29. plt.text(mu + sigma / 2, max(y) * 0.63,
    r"$\sigma$", ha="center")
30. plt.text(mu, -max(y) * 0.04, r"$\mu$",
    ha="center", va="top")
31.
32. plt.xlabel("x", labelpad=15)
33. plt.yticks([])
34. plt.xticks([])
35.
36. ax = plt.gca()
37. ax.spines["left"].set_visible(False)
38. ax.spines["top"].set_visible(False)
39. ax.spines["right"].set_visible(False)
40.
41. plt.tight_layout()
42. plt.show()
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 4> 평균과 표준편차에 따른 정규분포 (1/3)

```
1.  import numpy as np
2.  import matplotlib.pyplot as plt
3.  import math
4.
5.  def normal_pdf(x, mu, sigma):
6.      return (1 / (math.sqrt(2 * math.pi) *
    sigma)) * np.exp(
7.          -0.5 * ((x - mu) / sigma) ** 2
8.      )
9.
10. # 공통 x 범위
11. x = np.linspace(-6, 6, 800)
12.
13. fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(12,
    3.5))
```

```
14. # (1) σ1 = σ2, μ1 ≠ μ2
15. mu1, mu2 = -2, 2
16. sigma = 1
17. axes[0].plot(x, normal_pdf(x, mu1, sigma),
    color="deepskyblue", linewidth=2)
18. axes[0].plot(x, normal_pdf(x, mu2, sigma),
    color="deepskyblue", linewidth=2)
19. axes[0].vlines([mu1, mu2], 0,
20.                normal_pdf(mu1, mu1, sigma),
21.                colors="black",
    linestyles="dashed")
22. axes[0].text(0, max(normal_pdf(x, mu1, sigma))
    * 0.7,
23.              r"$\sigma_1=\sigma_2$",
    ha="center")
24. axes[0].text(mu1, 0, r"$\mu_1$", ha="center",
    va="top")
25. axes[0].text(mu2, 0, r"$\mu_2$", ha="center",
    va="top")
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 4> 평균과 표준편차에 따른 정규분포 (2/3)

```
# (2) μ1 = μ2, σ1 ≠ σ2
mu = 0
sigma1, sigma2 = 0.7, 1.6
axes[1].plot(x, normal_pdf(x, mu, sigma1), color="deepskyblue", linewidth=2)
axes[1].plot(x, normal_pdf(x, mu, sigma2), color="deepskyblue", linewidth=2)
axes[1].vlines(mu, 0,
               normal_pdf(mu, mu, sigma1),
               colors="black", linestyles="dashed")
axes[1].text(mu + 0.3, max(normal_pdf(x, mu, sigma1)) * 0.85, r"$\sigma_1$")
axes[1].text(mu + 2.0, max(normal_pdf(x, mu, sigma2)) * 0.4, r"$\sigma_2$")
axes[1].text(mu, 0, r"$\mu_1=\mu_2$", ha="center", va="top")
```

```
# (3) μ1 ≠ μ2, σ1 ≠ σ2
mu1, sigma1 = -2, 0.7
mu2, sigma2 = 2, 1.5
axes[2].plot(x, normal_pdf(x, mu1, sigma1), color="deepskyblue", linewidth=2)
axes[2].plot(x, normal_pdf(x, mu2, sigma2), color="deepskyblue", linewidth=2)
axes[2].vlines([mu1, mu2], 0,
               [normal_pdf(mu1, mu1, sigma1),
                normal_pdf(mu2, mu2, sigma2)],
               colors="black", linestyles="dashed")
axes[2].text(mu1 + 0.2, max(normal_pdf(x, mu1, sigma1)) * 0.85, r"$\sigma_1$")
axes[2].text(mu2 + 0.5, max(normal_pdf(x, mu2, sigma2)) * 0.5, r"$\sigma_2$")
axes[2].text(mu1, 0, r"$\mu_1$", ha="center", va="top")
axes[2].text(mu2, 0, r"$\mu_2$", ha="center", va="top")
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 4> 평균과 표준편차에 따른 정규분포 (3/3)

```
50. # 공통 스타일
51. for ax in axes:
52.     ax.set_xlim(-6, 6)
53.     ax.set_yticks([])
54.     ax.set_xticks([])
55.     for spine in ax.spines.values():
56.         spine.set_visible(True)
57.         spine.set_linewidth(1.0)
58.
59. plt.tight_layout()
60. plt.show()
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 5> 기존의 정규분포와 변환된 표준정규분포 (1/3)

```
1.  import numpy as np
2.  import matplotlib.pyplot as plt
3.  import math
4.
5.  def normal_pdf(x, mu, sigma):
6.      return (1 / (math.sqrt(2 * math.pi) *
    sigma)) * np.exp(
7.          -0.5 * ((x - mu) / sigma) ** 2
8.      )
9.
10. # 파라미터
11. mu = 0.0
12.
13. sigma_left  = 1.0   # 왼쪽
14. sigma_right = 0.6   # 오른쪽
15.
16. # 음영 구간
17. x1_left,  x2_left  = -1.4, 0.7
18. x1_right, x2_right = -0.8, 0.4
19.
20. # x 범위 (공통)
21. x = np.linspace(-4, 4, 3000)
```

```
22. y_left  = normal_pdf(x, mu, sigma_left)
23. y_right = normal_pdf(x, mu, sigma_right)
24.
25. # y축 공통 기준
26. y_max = max(y_left.max(), y_right.max()) * 1.1
27.
28. fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(9, 3.5))
29. eps = 0  # 음영 크기 보정
30.
31. # ---------- 왼쪽 ----------
32. ax = axes[0]
33. ax.plot(x, y_left, color="deepskyblue",
    linewidth=2)
34.
35. mask = (x >= x1_left - eps) & (x <= x2_left +
    eps)
36. ax.fill_between(x[mask], y_left[mask],
37.                 color="deepskyblue", alpha=0.18)
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 5> 기존의 정규분포와 변환된 표준정규분포 (2/3)

```
38. # 수직 점선
39. ax.vlines(
40.     [x1_left, x2_left], [0, 0],
41.     [normal_pdf(x1_left, mu, sigma_left),
42.      normal_pdf(x2_left, mu, sigma_left)],
43.     colors="deepskyblue", linestyles="dashed",
    linewidth=1.4
44. )
45. ax.vlines(mu, 0, normal_pdf(mu, mu, sigma_left),
46.           colors="deepskyblue",
    linestyles="dashed", linewidth=1.4)
47.
48. ax.text(x1_left, -0.02, r"$x_1$", ha="center",
    va="top")
49. ax.text(x2_left, -0.02, r"$x_2$", ha="center",
    va="top")
50. ax.text(mu, -0.02, r"$\mu$", ha="center",
    va="top")
51. ax.text(1.8, y_left.max()*0.6, r"$\sigma$",
    fontsize=11)
```

```
52. ax.set_xlabel("x", labelpad=15)
53. ax.set_xlim(-4, 4)
54. ax.set_ylim(0, y_max)
55. ax.set_yticks([])
56. ax.set_xticks([])
57.
58. # ---------- 오른쪽 ----------
59. ax = axes[1]
60. ax.plot(x, y_right, color="deepskyblue",
    linewidth=2)
61.
62. mask = (x >= x1_right - eps) & (x <= x2_right +
    eps)
63. ax.fill_between(x[mask], y_right[mask],
64.                 color="deepskyblue", alpha=0.18)
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 5> 기존의 정규분포와 변환된 표준정규분포 (3/3)

```
65. ax.vlines(
66.     [x1_right, x2_right], [0, 0],
67.     [normal_pdf(x1_right, mu, sigma_right),
68.      normal_pdf(x2_right, mu, sigma_right)],
69.     colors="deepskyblue", linestyles="dashed",
    linewidth=1.4
70. )
71. ax.vlines(mu, 0, normal_pdf(mu, mu,
    sigma_right),
72.           colors="deepskyblue",
    linestyles="dashed", linewidth=1.4)
73.
74. ax.text(x1_right, -0.02, r"$z_1$", ha="center",
    va="top")
75. ax.text(x2_right, -0.02, r"$z_2$", ha="center",
    va="top")
76. ax.text(mu, -0.02, r"$0$", ha="center",
    va="top")
77. ax.text(0.9, y_right.max()*0.7, r"$\sigma=1$",
    fontsize=11)
```

```
78. ax.set_xlabel("z", labelpad=15)
79. ax.set_xlim(-4, 4)
80. ax.set_ylim(0, y_max)
81. ax.set_yticks([])
82. ax.set_xticks([])
83.
84. # ---------- 공통 스타일 ----------
85. for ax in axes:
86.     ax.spines["left"].set_visible(False)
87.     ax.spines["top"].set_visible(False)
88.     ax.spines["right"].set_visible(False)
89.
90. plt.tight_layout()
91. plt.show()
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 7> 예제 6.2 표준정규분포도 (1/3)

```
1.  import numpy as np
2.  import matplotlib.pyplot as plt
3.  import math
4.
5.  def normal_pdf(x, mu=0, sigma=1):
6.      return (1 / (math.sqrt(2 * math.pi) *
    sigma)) * np.exp(
7.          -0.5 * ((x - mu) / sigma) ** 2
8.      )
9.
10. # 공통 설정
11. z = np.linspace(-4, 4, 3000)
12. y = normal_pdf(z)
13.
14. fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(9, 3.5))
15.
16. # (a) 오른쪽 꼬리: P(Z ≥ 1.84)
17. z_a = 1.84
18. y_za = normal_pdf(z_a)
```

```
19. ax = axes[0]
20. ax.plot(z, y, color="deepskyblue", linewidth=2)
21. # 음영 (오른쪽 꼬리)
22. mask = z >= z_a
23. ax.fill_between(z[mask], y[mask],
24.                 color="deepskyblue", alpha=0.18)
25. # 수직 점선 (0) + 경계선(1.84)
26. ax.vlines(0, 0, normal_pdf(0),
27.           colors="deepskyblue",
    linestyles="dashed", linewidth=1.4)
28. ax.vlines(z_a, 0, y_za,
29.           colors="deepskyblue", linewidth=1.4)
30.
31. ax.text(0, -0.02, r"$0$", ha="center", va="top")
32. ax.text(z_a, -0.02, r"$1.84$", ha="center",
    va="top")
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 7> 예제 6.2 표준정규분포도 (2/3)

```
33. ax.set_xlabel("z", labelpad=15)
34. ax.set_xlim(-4, 4)
35. ax.set_ylim(0, y.max() * 1.1)
36. ax.set_yticks([])
37. ax.set_xticks([])
38.
39. ax.text(0.5, -0.25, "(a)",
    transform=ax.transAxes,
40.         ha="center", va="top", fontsize=12)
41.
42. # (b) 구간: P(-1.97 ≤ Z ≤ 0.86)
43. z1, z2 = -1.97, 0.86
44. y_z1 = normal_pdf(z1)
45. y_z2 = normal_pdf(z2)
```

```
46. ax = axes[1]
47. ax.plot(z, y, color="deepskyblue", linewidth=2)
48. # 음영 (구간)
49. mask = (z >= z1) & (z <= z2)
50. ax.fill_between(z[mask], y[mask],
51.                 color="deepskyblue", alpha=0.18)
52. # 수직 점선 (0) + 경계선(z1, z2)
53. ax.vlines(0, 0, normal_pdf(0),
54.           colors="deepskyblue",
    linestyles="dashed", linewidth=1.4)
55. ax.vlines([z1, z2], [0, 0], [y_z1, y_z2],
56.           colors="deepskyblue", linewidth=1.4)
57.
58. ax.text(z1, -0.02, r"$-1.97$", ha="center",
    va="top")
59. ax.text(0, -0.02, r"$0$", ha="center", va="top")
60. ax.text(z2, -0.02, r"$0.86$", ha="center",
    va="top")
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 7> 예제 6.2 표준정규분포도 (3/3)

```
61. ax.set_xlabel("z", labelpad=15)
62. ax.set_xlim(-4, 4)
63. ax.set_ylim(0, y.max() * 1.1)
64. ax.set_yticks([])
65. ax.set_xticks([])
66.
67. ax.text(0.5, -0.25, "(b)",
    transform=ax.transAxes,
68.         ha="center", va="top", fontsize=12)
69.
70. # 공통 스타일
71. for ax in axes:
72.     ax.spines["left"].set_visible(False)
73.     ax.spines["top"].set_visible(False)
74.     ax.spines["right"].set_visible(False)
75.
76. plt.tight_layout()
77. plt.show()
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 8> 예제 6.3 (a) 표준정규분포 (1/2)

```
1.  import numpy as np
2.  import matplotlib.pyplot as plt
3.  import math
4.
5.  def normal_pdf(x, mu=0, sigma=1):
6.      return (1 / (math.sqrt(2 * math.pi) *
    sigma)) * np.exp(
7.          -0.5 * ((x - mu) / sigma) ** 2
8.      )
9.  # 공통 설정
10. x = np.linspace(-4, 4, 3000)
11. y = normal_pdf(x)
12.
13. # (a) 오른쪽 꼬리: P(X ≥ k) = 0.3015
14. k = 0.52
15. prob = 0.3015
16.
17. plt.figure(figsize=(4.5, 3.5))
18. plt.plot(x, y, color="deepskyblue", linewidth=2)
```

```
19. # 음영
20. mask = x >= k
21. plt.fill_between(x[mask], y[mask],
22.                  color="deepskyblue",
    alpha=0.18)
23.
24. # 수직선
25. plt.vlines(0, 0, normal_pdf(0),
26.            colors="deepskyblue",
    linestyles="dashed", linewidth=1.4)
27. plt.vlines(k, 0, normal_pdf(k),
28.            colors="deepskyblue", linewidth=1.4)
29.
30. # 텍스트
31. plt.text(0, -0.02, r"$0$", ha="center",
    va="top")
32. plt.text(k, -0.02, r"$k$", ha="center",
    va="top")
33. plt.text(k + 0.35, normal_pdf(k) * 0.35,
    f"{prob}", fontsize=11)
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 8> 예제 6.3 (a) 표준정규분포 (1/2)

```
34. plt.xlabel("z", labelpad=15)
35. plt.xlim(-4, 4)
36. plt.ylim(0, y.max() * 1.1)
37. plt.yticks([])
38. plt.xticks([])
39.
40. ax = plt.gca()
41. ax.spines["left"].set_visible(False)
42. ax.spines["top"].set_visible(False)
43. ax.spines["right"].set_visible(False)
44.
45. plt.tight_layout()
46. plt.show()
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 9> 예제 6.3 (b) 표준정규분포 (1/2)

```
1.  import numpy as np
2.  import matplotlib.pyplot as plt
3.  import math
4.
5.  def normal_pdf(x, mu=0, sigma=1):
6.      return (1 / (math.sqrt(2 * math.pi) *
    sigma)) * np.exp(
7.          -0.5 * ((x - mu) / sigma) ** 2
8.      )
9.
10. # 공통 설정
11. x = np.linspace(-4, 4, 3000)
12. y = normal_pdf(x)
13.
14. # (b) 구간: P(k ≤ X ≤ -0.18) = 0.4197
15. k = -1.5
16. z = -0.18
17. prob = 0.4197
18.
19. plt.figure(figsize=(4.5, 3.5))
20. plt.plot(x, y, color="deepskyblue", linewidth=2)
```

```
21. # 음영
22. mask = (x >= k) & (x <= z)
23. plt.fill_between(x[mask], y[mask],
24.                  color="deepskyblue",
    alpha=0.18)
25.
26. # 수직선
27. plt.vlines(0, 0, normal_pdf(0),
28.            colors="deepskyblue",
    linestyles="dashed", linewidth=1.4)
29. plt.vlines([k, z], [0, 0],
30.            [normal_pdf(k), normal_pdf(z)],
31.            colors="deepskyblue", linewidth=1.4)
32.
33. # 텍스트
34. plt.text(k, -0.02, r"$k$", ha="center",
    va="top")
35. plt.text(z, -0.02, r"$-0.18$", ha="center",
    va="top")
36. plt.text(-0.9, normal_pdf(-0.9) * 0.45,
    f"{prob}", fontsize=11)
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 9> 예제 6.3 (b) 표준정규분포 (2/2)

```
37. plt.xlabel("z", labelpad=15)
38. plt.xlim(-4, 4)
39. plt.ylim(0, y.max() * 1.1)
40. plt.yticks([])
41. plt.xticks([])

42. ax = plt.gca()
43. ax.spines["left"].set_visible(False)
44. ax.spines["top"].set_visible(False)
45. ax.spines["right"].set_visible(False)

46. plt.tight_layout()
47. plt.show()
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 10> 예제 6.4 정규분포 (1/2)

```
1.  import numpy as np
2.  import matplotlib.pyplot as plt
3.  import math
4.
5.  def normal_pdf(x, mu=0, sigma=1):
6.      return (1 / (math.sqrt(2 * math.pi) *
    sigma)) * np.exp(
7.          -0.5 * ((x - mu) / sigma) ** 2
8.      )
9.
10. # 설정
11. x = np.linspace(-4, 4, 3000)
12. y = normal_pdf(x)
13. x1 = -0.5
14. x2 = 1.2
15. y_x1 = normal_pdf(x1)
16. y_x2 = normal_pdf(x2)
17. y_0  = normal_pdf(0)
18. plt.figure(figsize=(6.5, 3))
19. # 정규분포 곡선
20. plt.plot(x, y, color="deepskyblue", linewidth=2)
```

```
21. # 음영 구간 [-0.5, 1.2]
22. mask = (x >= x1) & (x <= x2)
23. plt.fill_between(x[mask], y[mask],
24.                  color="deepskyblue",
    alpha=0.18)
25. # 수직선
26. plt.vlines(x1, 0, y_x1,
27.            colors="deepskyblue", linewidth=1.4)
28. plt.vlines(x2, 0, y_x2,
29.            colors="deepskyblue", linewidth=1.4)
30. # 평균 0 (점선)
31. plt.vlines(0, 0, y_0,
32.            colors="deepskyblue",
    linestyles="dashed", linewidth=1.4)
33. # 텍스트
34. plt.text(x1, -0.02, r"$-0.5$", ha="center",
    va="top")
35. plt.text(0,  -0.02, r"$0$", ha="center",
    va="top")
36. plt.text(x2, -0.02, r"$1.2$", ha="center",
    va="top")
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 10> 예제 6.4 정규분포 (2/2)

```
37. # 축 설정
38. plt.xlabel("z", labelpad=15)
39. plt.xlim(-4, 4)
40. plt.ylim(0, y.max() * 1.1)
41. plt.yticks([])
42. plt.xticks([])
43.
44. ax = plt.gca()
45. ax.spines["left"].set_visible(False)
46. ax.spines["top"].set_visible(False)
47. ax.spines["right"].set_visible(False)
48.
49. plt.tight_layout()
50. plt.show()
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 11> 예제 6.5 정규분포 (1/2)

```
1.  import numpy as np
2.  import matplotlib.pyplot as plt
3.  import math
4.
5.  def normal_pdf(x, mu, sigma):
6.      return (1 / (math.sqrt(2 * math.pi) *
    sigma)) * np.exp(
7.          -0.5 * ((x - mu) / sigma) ** 2
8.      )
9.
10. # 파라미터
11. mu = 300
12. sigma = 50
13. # 기준값
14. x0 = 362
15. # x 범위
16. x = np.linspace(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma,
    4000)
17. y = normal_pdf(x, mu, sigma)
18. y_mu = normal_pdf(mu, mu, sigma)
19. y_x0 = normal_pdf(x0, mu, sigma)
20.
21. plt.figure(figsize=(6.5, 3))
```

```
22. # 정규분포 곡선
23. plt.plot(x, y, color="deepskyblue", linewidth=2)
24.
25. # 음영
26. mask = x >= x0
27. plt.fill_between(x[mask], y[mask],
28.                 color="deepskyblue",
    alpha=0.18)
29. # 수직선
30. plt.vlines(mu, 0, y_mu,
31.            colors="deepskyblue",
    linestyles="dashed", linewidth=1.4)
32. plt.vlines(x0, 0, y_x0,
33.            colors="deepskyblue", linewidth=1.4)
34. # 텍스트
35. plt.text(mu, -y.max()*0.06, r"$300$",
    ha="center", va="top")
36. plt.text(x0, -y.max()*0.06, r"$362$",
    ha="center", va="top")
37. plt.text(mu + sigma*0.9, y.max()*0.65,
    r"$\sigma = 50$", fontsize=11)
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 11> 예제 6.5 정규분포 (2/2)

```
38. # 축 설정
39. plt.xlabel("x", labelpad=15)
40. plt.xlim(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma)
41. plt.ylim(0, y.max()*1.1)
42. plt.yticks([])
43. plt.xticks([])
44. ax = plt.gca()
45. ax.spines["left"].set_visible(False)
46. ax.spines["top"].set_visible(False)
47. ax.spines["right"].set_visible(False)
48.
49. plt.tight_layout()
50. plt.show()
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 12> 예제 6.6 정규분포 (1/3)

```
1.  import numpy as np
2.  import matplotlib.pyplot as plt
3.  import math
4.
5.  def normal_pdf(x, mu, sigma):
6.      return (1 / (math.sqrt(2 * math.pi) *
    sigma)) * np.exp(
7.          -0.5 * ((x - mu) / sigma) ** 2
8.      )
9.
10. # 파라미터
11. mu = 40
12. sigma = 6
13. # 꼬리 기준값
14. k_left  = 38.5   # (a) 왼쪽 꼬리
15. k_right = 43.5   # (b) 오른쪽 꼬리
16.
17. # x 범위
18. x = np.linspace(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma,
    4000)
19. y = normal_pdf(x, mu, sigma)
```

```
20. y_mu = normal_pdf(mu, mu, sigma)
21. y_kl = normal_pdf(k_left, mu, sigma)
22. y_kr = normal_pdf(k_right, mu, sigma)
23. fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(9, 3.5))
24. # (a) 왼쪽 꼬리
25. ax = axes[0]
26. ax.plot(x, y, color="deepskyblue", linewidth=2)
27. # 음영: 왼쪽 꼬리
28. mask = x <= k_left
29. ax.fill_between(x[mask], y[mask],
30.                 color="deepskyblue", alpha=0.18)
31. # 수직선
32. ax.vlines(mu, 0, y_mu,
33.           colors="deepskyblue",
    linestyles="dashed", linewidth=1.4)
34. ax.vlines(k_left, 0, y_kl,
35.           colors="deepskyblue", linewidth=1.4)
36. ax.text(mu, -y.max()*0.06, r"$40$", ha="center",
    va="top")
37. ax.text(mu + sigma*0.6, y.max()*0.7, r"$\sigma
    = 6$", fontsize=11)
38. ax.text(mu - sigma*1.1, y.max()*0.05, r"$0.45$",
    fontsize=11)
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 12> 예제 6.6 정규분포 (2/3)

```
39. ax.set_xlabel("x", labelpad=15)
40. ax.set_xlim(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma)
41. ax.set_ylim(0, y.max()*1.1)
42. ax.set_yticks([])
43. ax.set_xticks([])
44.
45. ax.text(0.5, -0.25, "(a)",
    transform=ax.transAxes,
46.         ha="center", va="top", fontsize=12)
47.
48. # (b) 오른쪽 꼬리
49. ax = axes[1]
50. ax.plot(x, y, color="deepskyblue", linewidth=2)
51. # 음영: 오른쪽 꼬리
52. mask = x >= k_right
53. ax.fill_between(x[mask], y[mask],
54.                 color="deepskyblue", alpha=0.18)
```

```
55. # 수직선
56. ax.vlines(mu, 0, y_mu,
57.           colors="deepskyblue",
    linestyles="dashed", linewidth=1.4)
58. ax.vlines(k_right, 0, y_kr,
59.           colors="deepskyblue", linewidth=1.4)
60. ax.text(mu, -y.max()*0.06, r"$40$", ha="center",
    va="top")
61. ax.text(mu + sigma*0.6, y.max()*0.7, r"$\sigma
    = 6$", fontsize=11)
62. ax.text(mu + sigma*0.9, y.max()*0.05, r"$0.14$",
    fontsize=11)
63.
64. ax.set_xlabel("x", labelpad=15)
65. ax.set_xlim(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma)
66. ax.set_ylim(0, y.max()*1.1)
67. ax.set_yticks([])
68. ax.set_xticks([])
69.
70. ax.text(0.5, -0.25, "(b)",
    transform=ax.transAxes,
71.         ha="center", va="top", fontsize=12)
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 12> 예제 6.6 정규분포 (3/3)

```
72. # 공통 스타일
73. for ax in axes:
74.     ax.spines["left"].set_visible(False)
75.     ax.spines["top"].set_visible(False)
76.     ax.spines["right"].set_visible(False)
77.
78. plt.tight_layout()
79. plt.show()
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 13> 예제 6.7 정규분포 (1/2)

```
1.  import numpy as np
2.  import matplotlib.pyplot as plt
3.  import math
4.
5.  def normal_pdf(x, mu, sigma):
6.      return (1 / (math.sqrt(2 * math.pi) *
    sigma)) * np.exp(
7.          -0.5 * ((x - mu) / sigma) ** 2
8.      )
9.
10. # 파라미터
11. mu = 3
12. sigma = 0.5
13. # 기준값
14. x0 = 2.3
15. # x 범위
16. x = np.linspace(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma,
    4000)
17. y = normal_pdf(x, mu, sigma)
18. y_mu = normal_pdf(mu, mu, sigma)
19. y_x0 = normal_pdf(x0, mu, sigma)
20.
21. plt.figure(figsize=(6.5, 3))
```

```
22. # 정규분포 곡선
23. plt.plot(x, y, color="deepskyblue", linewidth=2)
24. # 음영: 2.3 이하
25. mask = x <= x0
26. plt.fill_between(x[mask], y[mask],
27.                  color="deepskyblue",
    alpha=0.18)
28. # 수직선
29. plt.vlines(mu, 0, y_mu,
30.            colors="deepskyblue",
    linestyles="dashed", linewidth=1.4)
31. plt.vlines(x0, 0, y_x0,
32.            colors="deepskyblue", linewidth=1.4)
33. plt.text(mu, -y.max()*0.06, r"$3$", ha="center",
    va="top")
34. plt.text(x0, -y.max()*0.06, r"$2.3$",
    ha="center", va="top")
35. plt.text(mu + sigma*0.9, y.max()*0.65,
    r"$\sigma = 0.5$", fontsize=11)
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 13> 예제 6.7 정규분포 (2/2)

```
36. # 축 설정
37. plt.xlabel("x", labelpad=15)
38. plt.xlim(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma)
39. plt.ylim(0, y.max()*1.1)
40. plt.yticks([])
41. plt.xticks([])
42. ax = plt.gca()
43. ax.spines["left"].set_visible(False)
44. ax.spines["top"].set_visible(False)
45. ax.spines["right"].set_visible(False)
46.
47. plt.tight_layout()
48. plt.show()
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 14> 예제 6.8 정규분포 (1/2)

```
1.  import numpy as np
2.  import matplotlib.pyplot as plt
3.  import math
4.  def normal_pdf(x, mu, sigma):
5.      return (1 / (math.sqrt(2 * math.pi) *
    sigma)) * np.exp(
6.          -0.5 * ((x - mu) / sigma) ** 2
7.      )
8.
9.  # 파라미터
10. mu = 800
11. sigma = 40
12. # 구간
13. x1 = 778
14. x2 = 834
15. # x 범위
16. x = np.linspace(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma,
    4000)
17. y = normal_pdf(x, mu, sigma)
18. y_mu = normal_pdf(mu, mu, sigma)
19. y_x1 = normal_pdf(x1, mu, sigma)
20. y_x2 = normal_pdf(x2, mu, sigma)
21. plt.figure(figsize=(6.5, 3))
```

```
22. # 정규분포 곡선
23. plt.plot(x, y, color="deepskyblue", linewidth=2)
24. # 음영: [778, 834]
25. mask = (x >= x1) & (x <= x2)
26. plt.fill_between(x[mask], y[mask],
27.                  color="deepskyblue",
    alpha=0.18)
28. # 수직선
29. plt.vlines(x1, 0, y_x1,
30.            colors="deepskyblue", linewidth=1.4)
31. plt.vlines(x2, 0, y_x2,
32.            colors="deepskyblue", linewidth=1.4)
33. # 평균 (점선)
34. plt.vlines(mu, 0, y_mu,
35.            colors="deepskyblue",
    linestyles="dashed", linewidth=1.4)
36. plt.text(x1, -y.max()*0.06, r"$778$",
    ha="center", va="top")
37. plt.text(mu, -y.max()*0.06, r"$800$",
    ha="center", va="top")
38. plt.text(x2, -y.max()*0.06, r"$834$",
    ha="center", va="top")
39. plt.text(mu + sigma*0.9, y.max()*0.65,
    r"$\sigma = 40$", fontsize=11)
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 14> 예제 6.8 정규분포 (2/2)

```
40. # 축 설정
41. plt.xlabel("x", labelpad=15)
42. plt.xlim(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma)
43. plt.ylim(0, y.max()*1.1)
44. plt.yticks([])
45. plt.xticks([])
46. ax = plt.gca()
47. ax.spines["left"].set_visible(False)
48. ax.spines["top"].set_visible(False)
49. ax.spines["right"].set_visible(False)
50.
51. plt.tight_layout()
52. plt.show()
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 15> 예제 6.9 정규분포 (1/2)

```
1.  import numpy as np
2.  import matplotlib.pyplot as plt
3.  import math
4.  def normal_pdf(x, mu, sigma):
5.      return (1 / (math.sqrt(2 * math.pi) *
    sigma)) * np.exp(
6.          -0.5 * ((x - mu) / sigma) ** 2
7.      )
8.
9.  # 파라미터
10. mu = 3.0
11. sigma = 0.005
12. # 기준값
13. x_left = 2.99
14. x_right = 3.01
15. # x 범위
16. x = np.linspace(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma,
    4000)
17. y = normal_pdf(x, mu, sigma)
18. y_mu = normal_pdf(mu, mu, sigma)
19. y_l  = normal_pdf(x_left, mu, sigma)
20. y_r  = normal_pdf(x_right, mu, sigma)
21. plt.figure(figsize=(6.5, 3))
```

```
22. # 정규분포 곡선
23. plt.plot(x, y, color="deepskyblue", linewidth=2)
24. # 음영: 왼쪽 꼬리
25. mask_left = x <= x_left
26. plt.fill_between(x[mask_left], y[mask_left],
27.                  color="deepskyblue",
    alpha=0.18)
28. # 음영: 오른쪽 꼬리
29. mask_right = x >= x_right
30. plt.fill_between(x[mask_right], y[mask_right],
31.                  color="deepskyblue",
    alpha=0.18)
32. # 수직선
33. plt.vlines(mu, 0, y_mu,
34.            colors="deepskyblue",
    linestyles="dashed", linewidth=1.4)
35. plt.vlines(x_left, 0, y_l,
36.            colors="deepskyblue", linewidth=1.4)
37. plt.vlines(x_right, 0, y_r,
38.            colors="deepskyblue", linewidth=1.4)
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 15> 예제 6.9 정규분포 (2/2)

```
39. plt.text(x_left, -y.max()*0.08, r"$2.99$",
    ha="center", va="top")
40. plt.text(mu, -y.max()*0.08, r"$3.0$",
    ha="center", va="top")
41. plt.text(x_right, -y.max()*0.08, r"$3.01$",
    ha="center", va="top")
42. plt.text(x_left - sigma*1.2, y.max()*0.12,
    r"$0.0228$", fontsize=11)
43. plt.text(x_right + sigma*0.6, y.max()*0.12,
    r"$0.0228$", fontsize=11)
44. plt.text(mu + sigma*1.2, y.max()*0.7, r"$\sigma
    = 0.005$", fontsize=11)
```

```
45. # 축 설정
46. plt.xlabel("x", labelpad=22)
47. plt.xlim(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma)
48. plt.ylim(0, y.max()*1.15)
49. plt.yticks([])
50. plt.xticks([])
51. ax = plt.gca()
52. ax.spines["left"].set_visible(False)
53. ax.spines["top"].set_visible(False)
54. ax.spines["right"].set_visible(False)
55.
56. plt.tight_layout()
57. plt.show()
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 16> 예제 6.10 정규분포 (1/2)

```
1.  import numpy as np
2.  import matplotlib.pyplot as plt
3.  import math
4.  def normal_pdf(x, mu, sigma):
5.      return (1 / (math.sqrt(2 * math.pi) *
    sigma)) * np.exp(
6.          -0.5 * ((x - mu) / sigma) ** 2
7.      )
8.
9.  # 파라미터
10. mu = 1.5
11. sigma = 0.2
12. # 경계값
13. x_left = 1.108
14. x_right = 1.892
15. # x 범위
16. x = np.linspace(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma,
    4000)
17. y = normal_pdf(x, mu, sigma)
18. y_mu = normal_pdf(mu, mu, sigma)
19. y_l  = normal_pdf(x_left, mu, sigma)
20. y_r  = normal_pdf(x_right, mu, sigma)
21. plt.figure(figsize=(6.5, 3))
```

```
22. # 정규분포 곡선
23. plt.plot(x, y, color="deepskyblue", linewidth=2)
24. # 음영: 왼쪽 꼬리
25. mask_left = x <= x_left
26. plt.fill_between(x[mask_left], y[mask_left],
27.                  color="deepskyblue",
    alpha=0.18)
28. # 음영: 오른쪽 꼬리
29. mask_right = x >= x_right
30. plt.fill_between(x[mask_right], y[mask_right],
31.                  color="deepskyblue",
    alpha=0.18)
32. # 수직선
33. plt.vlines(mu, 0, y_mu,
34.            colors="deepskyblue",
    linestyles="dashed", linewidth=1.4)
35. plt.vlines(x_left, 0, y_l,
36.            colors="deepskyblue", linewidth=1.4)
37. plt.vlines(x_right, 0, y_r,
38.            colors="deepskyblue", linewidth=1.4)
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 16> 예제 6.10 정규분포 (2/2)

```
39. plt.text(x_left, -y.max()*0.08, r"$1.108$",
    ha="center", va="top")
40. plt.text(mu, -y.max()*0.08, r"$1.500$",
    ha="center", va="top")
41. plt.text(x_right, -y.max()*0.08, r"$1.892$",
    ha="center", va="top")
42. plt.text(x_left - sigma*0.9, y.max()*0.12,
    r"$0.025$", fontsize=11)
43. plt.text(x_right + sigma*0.4, y.max()*0.12,
    r"$0.025$", fontsize=11)
44. plt.text(mu + sigma*1.1, y.max()*0.7, r"$\sigma
    = 0.2$", fontsize=11)
```

```
45. # 축 설정
46. plt.xlabel("x", labelpad=22)
47. plt.xlim(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma)
48. plt.ylim(0, y.max()*1.15)
49. plt.yticks([])
50. plt.xticks([])
51. ax = plt.gca()
52. ax.spines["left"].set_visible(False)
53. ax.spines["top"].set_visible(False)
54. ax.spines["right"].set_visible(False)
55.
56. plt.tight_layout()
57. plt.show()
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 17> 예제 6.11 정규분포 (1/2)

```
1.  import numpy as np
2.  import matplotlib.pyplot as plt
3.  import math
4.
5.  def normal_pdf(x, mu, sigma):
6.      return (1 / (math.sqrt(2 * math.pi) *
    sigma)) * np.exp(
7.          -0.5 * ((x - mu) / sigma) ** 2
8.      )
9.
10. # 파라미터
11. mu = 40
12. sigma = 2.0
13. # 기준값
14. x0 = 43
15. # x 범위
16. x = np.linspace(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma,
    4000)
17. y = normal_pdf(x, mu, sigma)
18. y_mu = normal_pdf(mu, mu, sigma)
19. y_x0 = normal_pdf(x0, mu, sigma)
20. plt.figure(figsize=(6.5, 3))
```

```
21. # 정규분포 곡선
22. plt.plot(x, y, color="deepskyblue", linewidth=2)
23. # 음영: 43 이상 (오른쪽 꼬리)
24. mask = x >= x0
25. plt.fill_between(x[mask], y[mask],
26.                  color="deepskyblue",
    alpha=0.18)
27. # 수직선
28. plt.vlines(mu, 0, y_mu,
29.            colors="deepskyblue",
    linestyles="dashed", linewidth=1.4)
30. plt.vlines(x0, 0, y_x0,
31.            colors="deepskyblue", linewidth=1.4)
32. plt.text(mu, -y.max()*0.06, r"$40$",
    ha="center", va="top")
33. plt.text(x0, -y.max()*0.06, r"$43$",
    ha="center", va="top")
34. plt.text(mu + sigma*0.9, y.max()*0.65,
    r"$\sigma = 2.0$", fontsize=11)
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 17> 예제 6.11 정규분포 (2/2)

```
35. # 축 설정
36. plt.xlabel("x", labelpad=22)
37. plt.xlim(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma)
38. plt.ylim(0, y.max()*1.15)
39. plt.yticks([])
40. plt.xticks([])
41. ax = plt.gca()
42. ax.spines["left"].set_visible(False)
43. ax.spines["top"].set_visible(False)
44. ax.spines["right"].set_visible(False)
45.
46. plt.tight_layout()
47. plt.show()
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 18> 예제 6.12 정규분포 (1/2)

```
1.  import numpy as np
2.  import matplotlib.pyplot as plt
3.  import math
4.
5.  def normal_pdf(x, mu, sigma):
6.      return (1 / (math.sqrt(2 * math.pi) *
    sigma)) * np.exp(
7.          -0.5 * ((x - mu) / sigma) ** 2
8.      )
9.
10. # 분포 파라미터
11. mu = 40
12. sigma = 2.0
13. # 기준값
14. x0 = 43.5
15. # x 범위
16. x = np.linspace(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma,
    4000)
17. y = normal_pdf(x, mu, sigma)
18. y_mu = normal_pdf(mu, mu, sigma)
19. y_x0 = normal_pdf(x0, mu, sigma)
20. plt.figure(figsize=(6.5, 3))
```

```
21. # 정규분포 곡선
22. plt.plot(x, y, color="deepskyblue", linewidth=2)
23. # 음영: 43.5 이상 (오른쪽 꼬리)
24. mask = x >= x0
25. plt.fill_between(x[mask], y[mask],
26.                  color="deepskyblue",
    alpha=0.18)
27. # 수직선
28. plt.vlines(mu, 0, y_mu,
29.            colors="deepskyblue",
    linestyles="dashed", linewidth=1.4)
30. plt.vlines(x0, 0, y_x0,
31.            colors="deepskyblue", linewidth=1.4)
32. plt.text(mu, -y.max()*0.06, r"$40$",
    ha="center", va="top")
33. plt.text(x0, -y.max()*0.06, r"$43.5$",
    ha="center", va="top")
34. plt.text(mu + sigma*0.9, y.max()*0.65,
    r"$\sigma = 2.0$", fontsize=11)
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 18> 예제 6.12 정규분포 (2/2)

```
35. # 축 설정
36. plt.xlabel("x", labelpad=22)
37. plt.xlim(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma)
38. plt.ylim(0, y.max()*1.15)
39. plt.yticks([])
40. plt.xticks([])
41. ax = plt.gca()
42. ax.spines["left"].set_visible(False)
43. ax.spines["top"].set_visible(False)
44. ax.spines["right"].set_visible(False)
45.
46. plt.tight_layout()
47. plt.show()
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 19> 예제 6.13 정규분포 (1/2)

```
1.  import numpy as np
2.  import matplotlib.pyplot as plt
3.  import math
4.
5.  def normal_pdf(x, mu, sigma):
6.      return (1 / (math.sqrt(2 * math.pi) *
    sigma)) * np.exp(
7.          -0.5 * ((x - mu) / sigma) ** 2
8.      )
9.
10. # 파라미터
11. mu = 74
12. sigma = 7
13. # 꼬리 확률 ~0.12
14. z_tail = 1.175
15. x0 = mu + sigma * z_tail   # ≈ 82.23
16. # x 범위
17. x = np.linspace(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma,
    4000)
18. y = normal_pdf(x, mu, sigma)
19. y_mu = normal_pdf(mu, mu, sigma)
20. y_x0 = normal_pdf(x0, mu, sigma)
21. plt.figure(figsize=(6.5, 3))
```

```
22. # 정규분포 곡선
23. plt.plot(x, y, color="deepskyblue", linewidth=2)
24. # 음영: 오른쪽 꼬리
25. mask = x >= x0
26. plt.fill_between(x[mask], y[mask],
27.                  color="deepskyblue",
    alpha=0.18)
28. # 수직선
29. plt.vlines(mu, 0, y_mu,
30.            colors="deepskyblue",
    linestyles="dashed", linewidth=1.4)
31. plt.vlines(x0, 0, y_x0,
32.            colors="deepskyblue", linewidth=1.4)
33. plt.text(mu, -y.max()*0.06, r"$74$",
    ha="center", va="top")
34. plt.text(mu + sigma*0.9, y.max()*0.65,
    r"$\sigma = 7$", fontsize=11)
35. plt.text(x0 + sigma*0.15, y.max()*0.12,
    r"$0.12$", fontsize=11)
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 19> 예제 6.13 정규분포 (2/2)

```
36. # 축 설정
37. plt.xlabel("x", labelpad=22)
38. plt.xlim(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma)
39. plt.ylim(0, y.max()*1.15)
40. plt.yticks([])
41. plt.xticks([])
42. ax = plt.gca()
43. ax.spines["left"].set_visible(False)
44. ax.spines["top"].set_visible(False)
45. ax.spines["right"].set_visible(False)
46.
47. plt.tight_layout()
48. plt.show()
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 20> 예제 6.14 정규분포 (1/2)

```
1.  import numpy as np
2.  import matplotlib.pyplot as plt
3.  import math
4.
5.  def normal_pdf(x, mu, sigma):
6.      return (1 / (math.sqrt(2 * math.pi) *
    sigma)) * np.exp(
7.          -0.5 * ((x - mu) / sigma) ** 2
8.      )
9.
10. # 파라미터
11. mu = 74
12. sigma = 7
13. # D6 (표준정규 분위수 z_0.6 ≈ 0.253)
14. z_06 = 0.253
15. D6 = mu + sigma * z_06   # ≈ 75.77
16. # x 범위
17. x = np.linspace(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma,
    4000)
18. y = normal_pdf(x, mu, sigma)
19. y_mu = normal_pdf(mu, mu, sigma)
20. y_D6 = normal_pdf(D6, mu, sigma)
21. plt.figure(figsize=(6.5, 3))
```

```
22. # 정규분포 곡선
23. plt.plot(x, y, color="deepskyblue", linewidth=2)
24. # 음영: 왼쪽 누적 (≤ D6)
25. mask = x <= D6
26. plt.fill_between(x[mask], y[mask],
27.                  color="deepskyblue",
    alpha=0.18)
28. # 수직선
29. plt.vlines(mu, 0, y_mu,
30.            colors="deepskyblue",
    linestyles="dashed", linewidth=1.4)
31. plt.vlines(D6, 0, y_D6,
32.            colors="deepskyblue", linewidth=1.4)
33. plt.text(mu, -y.max()*0.06, r"$74$",
    ha="center", va="top")
34. plt.text(D6, -y.max()*0.06, r"$D_6$",
    ha="center", va="top")
35. plt.text(mu - sigma*0.3, y.max()*0.35, r"$0.6$",
    fontsize=12)
36. plt.text(mu + sigma*0.9, y.max()*0.65,
    r"$\sigma = 7$", fontsize=11)
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 20> 예제 6.14 정규분포 (2/2)

```
37. # 축 설정
38. plt.xlabel("x", labelpad=22)
39. plt.xlim(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma)
40. plt.ylim(0, y.max()*1.15)
41. plt.yticks([])
42. plt.xticks([])
43. ax = plt.gca()
44. ax.spines["left"].set_visible(False)
45. ax.spines["top"].set_visible(False)
46. ax.spines["right"].set_visible(False)
47.
48. plt.tight_layout()
49. plt.show()
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 21> n이 크고 p가 0이나 1에 가깝지 않은 경우의 이항분포

```
1.  import numpy as np
2.  import matplotlib.pyplot as plt
3.  import math
4.
5.  def binom_pmf(k, n, p):
6.      return math.comb(n, k) * (p ** k) * ((1 - p)
    ** (n - k))
7.
8.  def pmf_array(n, p):
9.      ks = np.arange(0, n + 1)
10.     ys = np.array([binom_pmf(int(k), n, p) for
    k in ks], dtype=float)
11.     return ks, ys
12.
13. # 설정
14. p = 0.2
15. cases = [
16.     (100, "blue", "n=100, p=0.2"),
17.     (200, "red",  "n=200, p=0.2"),
18.     (400, "lime", "n=400, p=0.2"),
19. ]
20. plt.figure(figsize=(6, 4), dpi=120)
```

```
21. # 막대그래프
22. for n, color, label in cases:
23.     ks, ys = pmf_array(n, p)
24.     plt.bar(
25.         ks, ys,
26.         width=0.85,
27.         color=color,
28.         alpha=0.35,
29.         edgecolor="black",
30.         linewidth=0.2,
31.         label=label
32.     )
33. # 축 / 범례
34. plt.xlim(-0.5, 100.5)
35. plt.ylim(0, 0.11)
36. plt.legend(loc="upper right", fontsize=9,
    frameon=True)
37. plt.tick_params(direction="in", top=True,
    right=True)
38. plt.xlabel("x")
39. plt.tight_layout()
40. plt.show()
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 22> p가 $\frac{1}{2}$에 가까운 경우의 이항분포

```
1.  import numpy as np
2.  import matplotlib.pyplot as plt
3.  import math
4.
5.  def binom_pmf(k, n, p):
6.      return math.comb(n, k) * (p ** k) * ((1 - p)
    ** (n - k))
7.
8.  def pmf_array(n, p):
9.      ks = np.arange(0, n + 1)
10.     ys = np.array([binom_pmf(int(k), n, p) for
    k in ks], dtype=float)
11.     return ks, ys
12.
13. # 설정
14. p = 0.5
15. cases = [
16.     (5,  "blue", "n=5,  p=0.5"),
17.     (15, "red",  "n=15, p=0.5"),
18.     (25, "lime", "n=25, p=0.5"),
19. ]
20. plt.figure(figsize=(6, 4), dpi=120)
```

```
21. # 막대그래프
22. for n, color, label in cases:
23.     ks, ys = pmf_array(n, p)
24.     plt.bar(
25.         ks, ys,
26.         width=0.85,
27.         color=color,
28.         alpha=0.8,
29.         edgecolor="black",
30.         linewidth=0.2,
31.         label=label
32.     )
33. # 축 / 범례
34. plt.xlim(-0.5, 20.5)
35. plt.ylim(0, 0.5)
36. plt.legend(loc="upper right", fontsize=9,
    frameon=True)
37. plt.tick_params(direction="in", top=True,
    right=True)
38. plt.xlabel("x")
39. plt.tight_layout()
40. plt.show()
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 24> 예제 6.15 표준정규분포 (1/2)

```
1.  import numpy as np
2.  import matplotlib.pyplot as plt
3.  import math
4.
5.  def normal_pdf(x, mu=0, sigma=1):
6.      return (1 / (math.sqrt(2 * math.pi) *
    sigma)) * np.exp(
7.          -0.5 * ((x - mu) / sigma) ** 2
8.      )
9.
10. # 파라미터
11. mu = 0
12. sigma = 1
13. # 기준값
14. x0 = -2.14
15. # x 범위
16. x = np.linspace(-4, 4, 4000)
17. y = normal_pdf(x, mu, sigma)
18. y_mu = normal_pdf(mu, mu, sigma)
19. y_x0 = normal_pdf(x0, mu, sigma)
20. plt.figure(figsize=(6.5, 3))
```

```
21. # 정규분포 곡선
22. plt.plot(x, y, color="deepskyblue", linewidth=2)
23. # 음영: 왼쪽 꼬리
24. mask = x <= x0
25. plt.fill_between(x[mask], y[mask],
26.                  color="deepskyblue",
    alpha=0.18)
27. # 수직선
28. plt.vlines(mu, 0, y_mu,
29.            colors="deepskyblue",
    linestyles="dashed", linewidth=1.4)
30. plt.vlines(x0, 0, y_x0,
31.            colors="deepskyblue", linewidth=1.4)
32. plt.text(mu, -y.max()*0.06, r"$0$", ha="center",
    va="top")
33. plt.text(x0, -y.max()*0.06, r"$-2.14$",
    ha="center", va="top")
34. plt.text(mu + 1.0, y.max()*0.65, r"$\sigma =
    1$", fontsize=11)
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 24> 예제 6.15 표준정규분포 (2/2)

```
35. # 축 설정
36. plt.xlabel("z", labelpad=22)
37. plt.xlim(-4, 4)
38. plt.ylim(0, y.max()*1.15)
39. plt.yticks([])
40. plt.xticks([])
41. ax = plt.gca()
42. ax.spines["left"].set_visible(False)
43. ax.spines["top"].set_visible(False)
44. ax.spines["right"].set_visible(False)
45.
46. plt.tight_layout()
47. plt.show()
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 25> 예제 6.16 확률밀도함수도 (1/2)

```
1.  import numpy as np
2.  import matplotlib.pyplot as plt
3.  import math
4.
5.  def normal_pdf(x, mu=0, sigma=1):
6.      return (1 / (math.sqrt(2 * math.pi) *
    sigma)) * np.exp(
7.          -0.5 * ((x - mu) / sigma) ** 2
8.      )
9.
10. # 파라미터
11. mu = 0
12. sigma = 1
13. # 구간
14. x1 = 1.16
15. x2 = 2.71
16. # x 범위
17. x = np.linspace(-4, 4, 4000)
18. y = normal_pdf(x, mu, sigma)
19. y_mu = normal_pdf(mu, mu, sigma)
20. y_x1 = normal_pdf(x1, mu, sigma)
21. y_x2 = normal_pdf(x2, mu, sigma)
22. plt.figure(figsize=(6.5, 3))
```

```
23. # 정규분포 곡선
24. plt.plot(x, y, color="deepskyblue", linewidth=2)
25. # 음영: [1.16, 2.71]
26. mask = (x >= x1) & (x <= x2)
27. plt.fill_between(x[mask], y[mask],
28.                  color="deepskyblue",
    alpha=0.18)
29. # 수직선
30. plt.vlines(mu, 0, y_mu,
31.            colors="deepskyblue",
    linestyles="dashed", linewidth=1.4)
32. plt.vlines(x1, 0, y_x1,
33.            colors="deepskyblue", linewidth=1.4)
34. plt.vlines(x2, 0, y_x2,
35.            colors="deepskyblue", linewidth=1.4)
36. plt.text(mu, -y.max()*0.06, r"$0$", ha="center",
    va="top")
37. plt.text(x1, -y.max()*0.06, r"$1.16$",
    ha="center", va="top")
38. plt.text(x2, -y.max()*0.06, r"$2.71$",
    ha="center", va="top")
39. plt.text(mu + 1.2, y.max()*0.65, r"$\sigma =
    1$", fontsize=11)
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 25> 예제 6.16 확률밀도함수도 (2/2)

```
40. # 축 설정
41. plt.xlabel("z", labelpad=22)
42. plt.xlim(-4, 4)
43. plt.ylim(0, y.max()*1.15)
44. plt.yticks([])
45. plt.xticks([])
46. ax = plt.gca()
47. ax.spines["left"].set_visible(False)
48. ax.spines["top"].set_visible(False)
49. ax.spines["right"].set_visible(False)
50.
51. plt.tight_layout()
52. plt.show()
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 26> α, β에 따른 감마분포의 변화

```
1.  import numpy as np
2.  import matplotlib.pyplot as plt
3.  import math
4.
5.  def gamma_pdf(x, alpha, beta):
6.      # f(x) = x^{α-1} e^{-x/β} / (Γ(α) β^α),
    x > 0
7.      return (x**(alpha - 1) * np.exp(-x / beta))
    / (math.gamma(alpha) * beta**alpha)
8.
9.  # x 범위
10. x = np.linspace(0, 6, 4000)
11. x[0] = 1e-6
12. beta = 1
13. # 파라미터
14. alphas = [1, 2, 4]
15. plt.figure(figsize=(7.2, 4))
16. for a in alphas:
17.     y = gamma_pdf(x, a, beta)
18.     plt.plot(x, y, color="deepskyblue",
    linewidth=2)
```

```
19. plt.text(0.55, 0.65,
    r"$\alpha=1$"+"\n"+r"$\beta=1$", fontsize=11)
20. plt.text(1.7, 0.38,
    r"$\alpha=2$"+"\n"+r"$\beta=1$", fontsize=11)
21. plt.text(3.0, 0.23,
    r"$\alpha=4$"+"\n"+r"$\beta=1$", fontsize=11)
22. plt.xlabel("x", labelpad=10)
23. plt.ylabel(r"$f(x)$", rotation=0, labelpad=15)
24. plt.xlim(0, 6)
25. plt.ylim(0, 1.05)
26. plt.yticks([0.5, 1.0])
27. plt.xticks([0, 1, 2, 3, 4, 5, 6])
28. ax = plt.gca()
29. ax.spines["top"].set_visible(False)
30. ax.spines["right"].set_visible(False)
31. ax.spines["left"].set_linewidth(1.2)
32. ax.spines["bottom"].set_linewidth(1.2)
33.
34. plt.tight_layout()
35. plt.show()
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 27> β에 따른 지수분포의 변화

```
1.  import numpy as np
2.  import matplotlib.pyplot as plt
3.
4.  # 지수분포 PDF
5.  def exponential_pdf(x, lam):
6.      return lam * np.exp(-lam * x)
7.
8.  # x 범위
9.  x = np.linspace(0, 5, 1000)
10.
11. # 비교할 λ 값들
12. lambdas = [0.5, 1, 2, 3]
13.
14. plt.figure(figsize=(8, 5))
15.
16. for lam in lambdas:
17.     y = exponential_pdf(x, lam)
18.     plt.plot(x, y, label=f"β = {lam}")
```

```
19. plt.xlabel("x")
20. plt.ylabel("f(x)")
21. plt.grid(True, alpha=0.3)
22. plt.legend()
23. plt.tight_layout()
24. plt.show()
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 29> 자유도에 따른 카이제곱분포의 변화

```
1.  import numpy as np
2.  import matplotlib.pyplot as plt
3.  import math
4.
5.  # 카이제곱분포 PDF 함수 정의
6.  def chi_square_pdf(x, v):
7.      return (1 / (2**(v/2) * math.gamma(v/2))) *
    (x**(v/2 - 1)) * np.exp(-x/2)
8.
9.  # x 범위 설정
10. x = np.linspace(0.001, 20, 1000)
11.
12. # 비교할 자유도 값들
13. degrees = [1, 2, 5, 10]
14.
15. plt.figure(figsize=(8, 5))
16.
17. for v in degrees:
18.     y = chi_square_pdf(x, v)
19.     plt.plot(x, y, label=f"v = {v}")
```

```
20. plt.xlim(0, 20)
21. plt.ylim(0, 0.8)
22. plt.xlabel("x")
23. plt.ylabel("f(x)")
24. plt.grid(True, alpha=0.3)
25. plt.legend()
26. plt.tight_layout()
27. plt.show()
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 30> α, β에 따른 베타분포의 변화

```
1.  import numpy as np
2.  import matplotlib.pyplot as plt
3.  import math
4.
5.  # 베타분포 PDF 함수 정의
6.  def beta_pdf(x, a, b):
7.      B = math.gamma(a) * math.gamma(b) /
    math.gamma(a + b)
8.      return (x**(a - 1) * (1 - x)**(b - 1)) / B
9.
10. # x 범위 (0,1)
11. x = np.linspace(0.001, 0.999, 1000)
12.
13. # 비교할 (α, β) 조합
14. params = [
15.     (0.5, 0.5),
16.     (1, 1),
17.     (2, 2),
18.     (5, 1),
19.     (2, 5)
20. ]
```

```
21. plt.figure(figsize=(8, 5))
22.
23. for a, b in params:
24.     y = beta_pdf(x, a, b)
25.     plt.plot(x, y, label=f"α={a}, β={b}")
26.
27. plt.xlim(0, 1)
28. plt.ylim(0, 3)
29. plt.xlabel("x")
30. plt.ylabel("f(x)")
31. plt.grid(True, alpha=0.3)
32. plt.legend()
33. plt.tight_layout()
34. plt.show()
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 31> $\ln(X)$의 μ, σ에 따른 로그정규분포의 변화 (1/2)

```
1.  import numpy as np
2.  import matplotlib.pyplot as plt
3.  import math
4.
5.  # 비교할 (mu, sigma) 조합들
6.  params = [
7.      (0, 0.5),
8.      (0, 1.0),
9.      (0.5, 0.5)
10. ]
11.
12. x = np.linspace(0.001, 6, 1500)
13. y = np.linspace(-4, 4, 1500)
14. fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 4))
15.
16. # 로그정규분포
17. for mu, sigma in params:
18.
19.     lognormal_pdf = (
20.         1 / (x * sigma * math.sqrt(2 * math.pi))
21.         * np.exp(-(np.log(x) - mu)**2 / (2 *
    sigma**2))
22.     )
```

```
23.     EX = math.exp(mu + sigma**2 / 2)
24.     VarX = (math.exp(sigma**2) - 1) *
    math.exp(2*mu + sigma**2)
25.
26.     axs[0].plot(
27.         x, lognormal_pdf,
28.         label=f"μ={mu}, σ={sigma}\nE={EX:.2f},
    Var={VarX:.2f}"
29.     )
30.
31. axs[0].set_xlabel("X")
32. axs[0].set_ylabel("f(X)")
33. axs[0].grid(True, alpha=0.3)
34. axs[0].legend(fontsize=9)
35.
36. # 정규분포(ln(X))
37. for mu, sigma in params:
38.
39.     normal_pdf = (
40.         1 / (sigma * math.sqrt(2 * math.pi))
41.         * np.exp(-(y - mu)**2 / (2 * sigma**2))
42.     )
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 31> $\ln(X)$의 μ, σ에 따른 로그정규분포의 변화 (2/2)

```
43.     axs[1].plot(
44.         y, normal_pdf,
45.         label=f"μ={mu}, σ={sigma}"
46.     )
47.
48. axs[1].set_xlabel("ln(X)")
49. axs[1].set_ylabel("f(ln(X))")
50. axs[1].grid(True, alpha=0.3)
51. axs[1].legend(fontsize=9)
52.
53. plt.tight_layout()
54. plt.show()
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 32> 예제 6.23 로그정규분포

```
1.  import numpy as np
2.  import matplotlib.pyplot as plt
3.  import math
4.
5.  # 로그정규분포
6.  def lognormal_pdf(x, mu, sigma):
7.      return (1 / (x * sigma * math.sqrt(2 *
    math.pi))) * np.exp(
8.          - (np.log(x) - mu) ** 2 / (2 * sigma **
    2)
9.      )
10.
11. # 파라미터
12. mu = 3.2
13. sigma = 1
14. x0 = 8
15. # x 범위
16. x = np.linspace(0.01, 150, 3000)
17. y = lognormal_pdf(x, mu, sigma)
18. plt.figure(figsize=(7, 3.5))
19.
20. # 밀도함수
21. plt.plot(x, y, color="deepskyblue", linewidth=2)
```

```
22. # 수직 점선
23. y_x0 = lognormal_pdf(x0, mu, sigma)
24. plt.vlines(x0, 0, y_x0, colors="deepskyblue",
    linestyles="dashed")
25. # 음영
26. mask = x >= x0
27. plt.fill_between(x[mask], y[mask],
28.                  color="deepskyblue", alpha=0.25)
29. plt.text(20, max(y)*0.75, r"$\mu=3.2$",
    fontsize=11)
30. plt.text(20, max(y)*0.65, r"$\sigma=1$",
    fontsize=11)
31. plt.xlabel("x", labelpad=10)
32. plt.ylabel(r"$f(x)$", rotation=0, labelpad=15)
33. plt.xlim(0, 150)
34. plt.ylim(0, max(y) * 1.15)
35. plt.xticks([0, 8, 20, 40])
36. plt.yticks([])
37. ax = plt.gca()
38. ax.spines["top"].set_visible(False)
39. ax.spines["right"].set_visible(False)
40. plt.tight_layout()
41. plt.show()
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 33> 예제 6.24 로그정규분포

```
1.  import numpy as np
2.  import matplotlib.pyplot as plt
3.  import math
4.
5.  # 로그정규분포
6.  def lognormal_pdf(x, mu, sigma):
7.      return (1 / (x * sigma * math.sqrt(2 *
    math.pi))) * np.exp(
8.          - (np.log(x) - mu) ** 2 / (2 * sigma ** 2)
9.      )
10.
11. # 파라미터
12. mu = 5.149
13. sigma = 0.737
14. x_q = 51.265
15. # x 범위
16. x = np.linspace(1, 600, 4000)
17. y = lognormal_pdf(x, mu, sigma)
18. plt.figure(figsize=(7, 3.5))
19.
20. # 밀도함수
21. plt.plot(x, y, color="deepskyblue", linewidth=2)
```

```
22. # 수직 점선
23. y_q = lognormal_pdf(x_q, mu, sigma)
24. plt.vlines(x_q, 0, y_q,
25.             colors="deepskyblue",
    linestyles="dashed")
26. # 음영
27. mask = x <= x_q
28. plt.fill_between(x[mask], y[mask],
29.                  color="deepskyblue", alpha=0.25)
30. plt.text(150, max(y)*0.75, r"$\mu=5.149$",
    fontsize=11)
31. plt.text(150, max(y)*0.65, r"$\sigma=0.737$",
    fontsize=11)
32. plt.xlabel("x", labelpad=10)
33. plt.ylabel(r"$f(x)$", rotation=0, labelpad=15)
34. plt.xlim(0, 600)
35. plt.ylim(0, max(y) * 1.15)
36. plt.xticks([0, 50, 100, 200, 300])
37. plt.yticks([])
38. ax = plt.gca()
39. ax.spines["top"].set_visible(False)
40. ax.spines["right"].set_visible(False)
41. plt.tight_layout()
42. plt.show()
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 34> $\alpha = 1$일 때 β에 따른 와이블 분포 변화

```
1.  import numpy as np
2.  import matplotlib.pyplot as plt
3.  import math
4.
5.  def weibull_pdf(x, beta, eta=1):
6.      # f(x) = (β/η) (x/η)^{β-1} exp(-(x/η)^β), x
    ≥ 0
7.      return (beta / eta) * (x / eta)**(beta - 1)
    * np.exp(-(x / eta)**beta)
8.
9.  # x 범위
10. x = np.linspace(0, 2.2, 5000)
11. x[0] = 1e-6
12. # 파라미터
13. betas = [1, 2, 3.5]
14. eta = 1
15. # y 최대값 계산
16. y_max = 0
17. ys = {}
18. for b in betas:
19.     y = weibull_pdf(x, b, eta)
20.     ys[b] = y
21.     y_max = max(y_max, y.max())
```

```
22. plt.figure(figsize=(7.2, 4))
23. for b in betas:
24.     plt.plot(x, ys[b], color="deepskyblue",
    linewidth=2)
25. plt.text(0.15, y_max * 0.55, r"$\beta = 1$",
    fontsize=11)   # 위로
26. plt.text(0.75, y_max * 0.40, r"$\beta = 2$",
    fontsize=11)   # 위로
27. plt.text(1.05, y_max * 0.85, r"$\beta = 3.5$",
    fontsize=11) # 오른쪽으로
28. plt.xlabel("x", labelpad=10)
29. plt.ylabel(r"$f(x)$", rotation=0, labelpad=15)
30. plt.xlim(0, 2.2)
31. plt.ylim(0, y_max * 1.08)
32. plt.xticks([0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0])
33. plt.yticks([])
34. ax = plt.gca()
35. ax.spines["top"].set_visible(False)
36. ax.spines["right"].set_visible(False)
37. ax.spines["left"].set_linewidth(1.2)
38. ax.spines["bottom"].set_linewidth(1.2)
39. plt.tight_layout()
40. plt.show()
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 35> β에 따른 고장률 변화

```
1.  import numpy as np
2.  import matplotlib.pyplot as plt
3.
4.  # Hazard rate 정의
5.  # Z(t) = α β t^(β-1)
6.  def hazard_rate(t, alpha, beta):
7.      return alpha * beta * t**(beta - 1)
8.
9.  # 파라미터
10. alpha = 0.01
11. betas = [0.5, 1.0, 1.5]
12. # 시간 범위
13. t = np.linspace(0.01, 20, 2000)
14. plt.figure(figsize=(7, 4))
15.
16. # 곡선
17. for beta in betas:
18.     z = hazard_rate(t, alpha, beta)
19.     plt.plot(t, z, linewidth=2, label=fr"$\beta
    = {beta}$")
```

```
20. plt.xlabel("t", labelpad=10)
21. plt.ylabel("Z(t)", rotation=0, labelpad=15)
22. plt.legend()
23. plt.xlim(0, 20)
24. plt.ylim(0, hazard_rate(t, alpha, 1.5).max() *
    1.3)
25. ax = plt.gca()
26. ax.spines["top"].set_visible(False)
27. ax.spines["right"].set_visible(False)
28.
29. plt.tight_layout()
30. plt.show()
```

부록#4

- 그래프 코드
  - <그림 36> 예제 6.24 와이블 분포

```
1.  import numpy as np
2.  import matplotlib.pyplot as plt
3.
4.  # 와이블분포
5.  def weibull_pdf(x, alpha, beta):
6.      # f(x) = αβ x^{β-1} exp(-α x^β), x ≥ 0
7.      return alpha * beta * x**(beta - 1) *
    np.exp(-alpha * x**beta)
8.
9.  # 파라미터
10. alpha = 0.01
11. beta = 2
12. # x 범위
13. x = np.linspace(0, 30, 2000)
14. y = weibull_pdf(x, alpha, beta)
15. plt.figure(figsize=(7, 3.5))
16.
17. # 밀도함수
18. plt.plot(x, y, color="deepskyblue", linewidth=2)
19. # 수직선(점선)
20. plt.vlines(8, 0, weibull_pdf(8, alpha, beta),
21.            colors="deepskyblue",
    linestyles="dashed")
```

```
22. # 음영
23. mask = x <= 8
24. plt.fill_between(x[mask], y[mask],
25.                  color="deepskyblue",
    alpha=0.25)
26.
27. plt.text(14, max(y)*0.7, r"$\alpha=0.01$",
    fontsize=11)
28. plt.text(14, max(y)*0.6, r"$\beta=2$",
    fontsize=11)
29. plt.xlabel("x", labelpad=10)
30. plt.ylabel(r"$f(x)$", rotation=0, labelpad=15)
31. plt.xlim(0, 30)
32. plt.ylim(0, max(y) * 1.15)
33. plt.yticks([])
34. plt.xticks([0, 8, 16, 24])
35. ax = plt.gca()
36. ax.spines["top"].set_visible(False)
37. ax.spines["right"].set_visible(False)
38.
39. plt.tight_layout()
40. plt.show()
```